

Beleid SPEEKSELKLIERTUMOREN

1. Diagnostiek

- Klinisch onderzoek van hoofd- en halsgebied
- FNAC en/of biopsiename en/of FNAC halsklier (indien negatieve FNAC CNB te overwegen)
- MRI hals
- CT thorax bij lokaal, FDG PET-CT bij stadium III/IV
- Evaluatie operabiliteit: labo, eventueel consult algemeen inwendige, EKG
- Tandnazicht en -sanering

2. TNM-classificatie

zie 8ste editie UICC Major Salivary Glands

Opmerking: de tumoren van de mineure speekselklieren worden gestaged conform de anatomische site alwaar ze gelokaliseerd zijn (geen aparte staging).

3. Eerste behandeling

3.1 Primaire tumor

radicale excisie (met behoud functie indien mogelijk) +/- postoperatieve radiotherapie

3.2 Halsklieren

a) bij tumoren van de majeure speekselklieren

- cN0: halsevidement in geval van

- Positieve klier in vriescoupe per-operatief.
- Hooggradig
- cT3, cT4

- cN+: in principe altijd halsevidement

b) bij tumoren van de mineure speekselklieren wordt de behandeling volgens subsite uitgevoerd (zie aparte hoofdstukken).

3.3 Indicaties postoperatieve radiotherapie

- Grote tumoren: pT3, pT4
- Intermediaire of hoge graad maligniteit
- Adenoïd cystic tumor
- Positieve klieren
- Perineurale of lymfovasculaire invasie
- Marges positief
- Tumorspil

4. Follow up

4.1 Imaging

a) Imaging 3 maanden na beëindigen van therapie:

Primaire heekunde +- postoperatieve radio(chemo)therapie: MR hals

b) Imaging nadien:

Eerste 5-10 jaar: Jaarlijkse imaging van het hoofd- en halsgebied met MR hals en CT thorax

Na 10 jaar: imaging op indicatie.

4.2 Klinisch onderzoek

1 - 2 jaar: 3 maandelijks

3 - 5 jaar: om de 6 maanden

Na 5 jaar: om de 6 tot 12 maanden

5. Behandeling van recidief en/of metastatische ziekte

5.1 Locoregionaal of recidief op afstand, operabel:

heekunde – metastasectomie te overwegen en/of RT; +-systemische therapie

5.2 Locoregionaal of recidief op afstand, inoperabel:

Systemische chemotherapie, evt RT, evt. androgeenreceptor therapie indien AR+, evt. trastuzumab bij Her2+, larotrectinib bij NTRK-fusie, clinical trials of palliatieve zorgen.