

**ZOL GENK**  
Campus Sint-Jan  
Campus Sint-Barbara  
Medisch Centrum André Dumont  
**ZOL MAAS EN KEMPEN**



# Infusor®

**ZOL GENK**

Campus Sint-Jan  
Schiepse bos 6  
B 3600 Genk

**Campus Sint-Barbara**

Bessemmerstraat 478  
B 3620 Lanaken

**Medisch Centrum André Dumont**

Stalenstraat 2a  
B 3600 Genk

**ZOL MAAS EN KEMPEN**

Diestersteenweg 425  
B 3680 Maaseik

ZOL GENK  
tel. +32(0)89 32 50 50  
ZOL MAAS EN KEMPEN  
tel. +32(0)89 50 50 50  
info@zol.be

Beste patiënt,

De infusor® is een draagbare infuus pomp die medicatie (chemotherapie) geleidelijk en aan de juiste snelheid toedient. Deze gedoseerde toediening zorgt voor een optimale werking van de chemotherapie en beperkt de nevenwerkingen ervan. De infusor® is bestemd voor langdurige infusies in de thuissituatie, variërend van 44 uur tot 7 dagen.

De infusor® wordt aangeschakeld aan een poortkatheter. De poortkatheter wordt aangeprikt door de verpleegkundige van de dagkliniek Geneeskunde, door middel van een grippernaald. De grippernaald en de leiding worden zeer stevig gefixeerd op de borstkas door kleefpleisters, om het loskomen ervan te voorkomen.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder!

Inhoudsverantwoordelijke: dr. Y. Staelens (Oncoloog) | Juni 2022

## INHOUDSTAFEL

<b>1. Werking</b>	<b>3</b>
1.1 Voordelen	
<b>2. Aandachtspunten</b>	<b>3</b>
2.1 Bevestiging van de Infusor® aan het lichaam	
2.2 Temperatuur	
2.3 Baden of douchen	
2.4 's Nachts	
<b>3. Gevaren bij het dragen</b>	<b>5</b>
3.1 Wat moet u doen in geval van lekkage?	
3.2 Mogelijke problemen bij het gebruik van de Infusor®	
<b>4. Afsluiten en ontkoppelen van een Infusor®</b>	<b>6</b>
<b>5. Vragen</b>	<b>6</b>

# 01 WERKING

Binnenin de Infusor® zit een ballonnetje gevuld met chemotherapie. Bij het starten is het reservoir gevuld met medicatie. Doordat het ballonnetje geleidelijk aan samentrekt, wordt de medicatie toegediend. U kan zelf nakijken of het vloeistofniveau in het ballonnetje afneemt: het ballonnetje wordt korter en dunner (eerst in de lengte dan in de breedte). U merkt dit het best langs de streepjeszijde van het plastic omhulsel. Het reservoir kan ook gecontroleerd worden door dit te wegen met een keukenweegschaal (= nagaan of het gewicht vermindert). De Infusor® is bestemd voor éénmalig gebruik.

## 1.1 Voordelen

- U kunt deze kleine pomp gemakkelijk onder uw kledij dragen.
- De Infusor® beperkt u weinig in het dagelijkse leven.
- Het aantal ziekenhuisopnames kan op deze manier worden beperkt.

# 02 AANDACHTSPUNTEN

## 2.1 Bevestiging van de Infusor® aan het lichaam

Bij de Infusor® is een draagtasje voorzien dat u rond uw middel kan bevestigen en waarin u de Infusor® kan opbergen. Hij past ook in een binnenzak, borstzak of grote broekzak. Om te voorkomen dat u met de leiding ergens achter blijft haperen, kan de lengte van de leiding worden aangepast door deze op te rollen rond de Infusor®. De leiding moet goed gefixeerd zijn op de borstkas. Regelmatige controle van de klem, leiding en het verkleinen van de ballon is noodzakelijk.

De Infusor® belemmert u niet om uw dagelijkse of sportieve activiteiten te blijven beoefenen, zolang het geneesmiddel min of meer op kamertemperatuur blijft en niet blootgesteld wordt aan water. Het is echter aangeraden om de dagen van de toediening geen bruske bewegingen te maken of zwaar werk te verrichten, dit om te voorkomen dat de naald in de poortkatheter gaat verschuiven.

U kunt de Infusor® veilig gebruiken als er huisdieren in de buurt

zijn, maar zorg ervoor dat uw huisdier er niet op kan bijten of ermee kan spelen.



## 2.2 Temperatuur

De beste temperatuur voor het toedienen van de medicatie is lichaamstemperatuur. Daarom is het belangrijk dat het witte gedeelte goed vastgemaakt wordt op de huid. Vermijd grote temperatuurverschillen zoals deze ten gevolge van felle zon of vrieskoude. Bescherm de Infusor® tegen direct zonlicht.

## 2.3 Baden of douchen

Het is belangrijk dat er geen water aan het verband van de poortkatheter komt. Ook de Infusor® mag niet ondergedompeld of nat worden. Douchen wordt daarom afgeraden omdat het bijna onmogelijk is het verband en het pompje droog te houden.

Een bad nemen is mogelijk mits de nodige voorzichtigheid. U verpakt het pompje best in een plastic zak en legt het op een stoel naast het bad. Zit altijd goed rechtop in bad.

## 2.4 's Nachts

's Nachts legt u de Infusor® best naast u in bed of onder uw hoofdkussen, liever niet op het nachtkastje of op de grond.

# 03 GEVAREN BIJ HET DRAGEN

De inhoud van de Infusor® is chemotherapie en kan zeer agressief zijn bij contact met de huid, ogen of slijmvliezen. Het vrijkomen van medicatie door lekkage (door het loskomen van de grippernaald uit de poortkatheter of van de leiding) kan ernstige gevolgen hebben.

## 3.1 Wat moet u doen in geval van lekkage?

- Onmiddellijk contact opnemen met het ziekenhuis;
- Gebruik steeds wegwerphandschoenen;
- Klem dichtzetten;
- Spoel de huid overvloedig met water en breng een ijszak aan op de huid;
- Eventuele besmette oppervlakken overvloedig spoelen met water;
- Kledij die bevuild is met chemotherapie apart wassen, overvloedig spoelen in de wasmachine met een koud spoelprogramma en vervolgens wassen met het gewone wasprogramma. Indien het wassen niet onmiddellijk mogelijk is, moet het linnen in een goed

afgesloten, dubbele plastic zak worden bewaard.

## 3.2 Mogelijke problemen bij het gebruik van de Infusor®

- De klem staat niet open waardoor de inhoud niet wordt geleid: klem terug openzetten;
- Bloed in de leiding waardoor de leiding en de poortkatheter kunnen verstopen: contact opnemen met het ziekenhuis of de thuisverpleegkundige;
- Opzwellend, pijn, branderig gevoel rond de poortkatheter: klem dichtzetten, ijszak op de huid aanbrengen en onmiddellijk contact opnemen met het ziekenhuis;
- Pijn, branderig gevoel op de huid of een natte vlek op de kledij: Volg steeds de voorschriften zoals hierboven beschreven 'Wat moet u doen in geval van lekkage?'.

## 04 AFSLUITEN EN ONTKOPPELEN VAN EEN INFUSOR®

- Wanneer het reservoir leeg is, kan de Infusor® door de thuisverpleegkundige of in het ziekenhuis worden afgekoppeld.
- De poortkatheter wordt gespoeld en afgesloten met fysiologisch water. Daarna wordt de grippernaald verwijderd.
- Het afval (infusorpomp en leiding) wordt in het ziekenhuis via speciale containers verwijderd. Indien de thuisverpleegkundige de Infusor® afkoppelt, moet het afval in een dubbele plastic zak worden verzameld en de plastic zak moet worden dichtgeknoopt. Deze kan u bij de volgende behandeling meebrengen en afgeven aan de verpleegkundige. De grippernaald moet door de thuisverpleegkundige in een daarvoor bestemde naaldcontainer gedeponeerd worden.
- Er is een aparte brochure beschikbaar voor het afschakelen van een Infusor® door de thuisverpleging.

## 05 VRAGEN

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan uw arts of aan de (thuis)verpleegkundige.

Telefoonnummers waar u terecht kan bij vragen of problemen:

- Dagziekenhuis Geneeskunde, tel. 089 32 67 90 (van maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot 17 uur)
- Digestieve oncocoach, tel. 089 32 65 86 of 089 32 65 97 (van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur) - permanentie tel. 089 32 65 80.
- Algemeen nummer ZOL, tel. 089 32 50 50 (buiten de openingsuren van de dagkliniek)
- Dagziekenhuis inwendige 1 Maaseik, tel. 089 50 64 31 (van maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot 17uur)





[www.ZOL.be](http://www.ZOL.be)



[www.twitter.com/ZOLziekenhuis](https://www.twitter.com/ZOLziekenhuis)



[www.facebook.com/ZOLzh](https://www.facebook.com/ZOLzh)



[www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis](https://www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis)

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via [www.zol.be](http://www.zol.be)

Raadpleeg online uw medisch dossier via [www.mijnzol.be](http://www.mijnzol.be)