



Kinderen

Dosisaërosol

T +32(0)89 32 50 50
F +32(0)89 32 79 00
info@zol.be

Campus Sint-Jan
Schiepse bos 6
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk



Beste ouders,

De arts heeft voor uw kind een geneesmiddel via een verstuiver (dosisaërosol) voorgeschreven. In deze folder staan instructies die nauwkeurig moeten opgevolgd worden om een goede werking van het geneesmiddel te bekomen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

INHOUDSTAFEL

- 1. Gebruiksaanwijzing** 3
Dosisaërosol of puf met voorzetkamer (6 jaar of jonger)
Autohaler® (specifieke vorm van dosisaërosol)
- 2. Mediclowns** 4
- 3. Literatuurlijst** 5

01 GEBRUIKSAANWIJZING

Dosisaërosol of puf met voorzetskamer (6 jaar of jonger)

De dosisaërosol is een spuitbusje in een plastic houder.

In het spuitbusje bevinden zich fijne geneesmiddelendeeltjes, die vrijkomen als u erop duwt. Door het inademen van deze deeltjes, komt het geneesmiddel direct in de luchtwegen terecht, waardoor een optimale werking ter hoogte van de luchtwegen wordt bekomen met zo weinig mogelijk bijwerkingen. Het is een veelgebruikte techniek van medicatietoediening bij kinderen.

Een dosisaërosol kan met of zonder voorzetskamer gebruikt worden. Een voorzetskamer is een grote, van kunststof vervaardigde buisvormige koker met een klep die opengaat bij inademing. Een voorzetskamer is steeds aangegeven omdat jonge kinderen de juiste inhalatietechniek nog niet beheersen en omdat de medicatie anders gedeeltelijk in de mond terecht komt.

Gebruiksaanwijzing:

- Laat uw kind een rechtzittende houding aannemen.
- De verstuiver goed schudden.
- Verwijder de dop van het mondstuk en bevestig de dosisaërosol op de voorzetskamer.
- Voorzetskamer vullen met voorgeschreven medicatie (verstuif één puf per keer).
- Laat uw kind het hoofd licht achterover buigen.
- Laat hem/haar rustig ademhalen in de voorzetskamer en controleer de bewegingen van de kleppen.
- Uw kind moet 5 keer in- en uitademen in de kamer.

Wacht 5 tot 10 minuten tussen twee verschillende pufs. Bij dosisaërosol wordt aangeraden de mond na gebruik te spoelen met water (niet inslikken).

02 MEDICLOWNS

Autohaler® (specifieke vorm van dosisaërosol)

Hierbij gelden volgende aandachtspunten:

- Voor het gebruik het dopje afdoen, het toestel verticaal houden en het klepje bovenaan omhoog doen.
- Onderhoud van de voorzetkamer:
- Bij het eerste gebruik en vervolgens dagelijks de onderdelen van de voorzetkamer enkele minuten onderdompelen in lauw water met afwasmiddel (niet in de vaatwasser).
- De binnenzijde van de voorzetkamer mag niet afgedroogd worden. U moet de voorzetkamer op een propere doek aan de lucht laten drogen.

Het ZOL werkt samen met de Mediclowns. Op geregelde tijdstippen komen de clowns op de verpleegafdeling Pediatrie langs om een glimlach op de gezichtjes van de kinderen te toveren. Meer info over hun werking vind je op www.mediclowns.be.



mediclowns

ALLES VOOR JE GLIMLACH

03 LITERATUURLIJST

Bodart, E., Dab, I. De Boeck, K., Mossay, Ch. (2004). **Astma en het kind. Gids voor de clinicus**. Genval: GlaxoSmithKline.

Kock-Van Beerendonk, I. De Ridder, K. Den, Veld-Rentier, I. In 't Westmaas, A. (2006).

Specialistisch kinderverpleegkunde: zorg voor het zieke kind. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.

Lodewijckx, C., Schuermans, D.(2006).

Inhalatietherapie: praktische gids voor zorgverleners, Leuven/Voorburg: Acco.

Cauberg, M., Gaens, J., Goris, K., Hubrechts, C., Remans V., Vandersmissen, H.,Vangeneugden, K. (2006).

Verpleegkundige diagnostiek en interventies: practicum 2: inhalatietherapie – longziekten. Cursus KHLim: Algemene verpleegkunde, schooljaar 2005-2006.



www.ZOL.be



www.facebook.com/ZOLzh



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.