



Histamine provocatietest

ZOL GENK
Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemerstraat 478
B 3620 Lanaken
Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN
Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 32 50 50
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

WELKOM

U vernam van uw arts dat u een histamine provocatietest moet ondergaan. Deze brochure geeft u meer informatie over deze procedure en tracht op een aantal veel gestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende geneesheer en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

Inhoudsverantwoordelijke: prof. dr. D. Ruttens
(Pneumoloog) | Juni 2023

INHOUDSTAFEL

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Histamine provocatietest | 3 |
| 1.1 De voorbereiding | |
| 1.2 Verloop van het onderzoek | |
| 2. Vragen? | 8 |

01 HISTAMINE PROVOCATIETEST

Dit is een onderzoek om een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen, zoals gezien wordt bij astma, op te sporen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van histamine, een lichaamseigen stof. De stof kan een luchtwegirritatie uitlokken bij mensen met overgevoelige luchtwegen, terwijl het bij andere mensen geen noemenswaardige reactie geeft.

1.1 De voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn. Voor het goed slagen van de test dient u op voorhand te stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen, zoals de meeste inhalatiemedicijnen ('puffers'). In onderstaande lijst vindt u de medicatie op naam en het aantal uur dat u deze dient te stoppen voor het onderzoek.

1.1.1 Medicatie te stoppen bij Histamine provocatietest

Naam medicatie	Aantal uur te stoppen vòòr het onderzoek	Naam medicatie	Aantal uur te stoppen vòòr het onderzoek
Actifed	48 u	Merck -Loratadine	48 u
Aerius	48 u	Mistamine	48 u
Airomir	8 u	Oxis	48 u
Atrovent	8 u	Oxivent	8 u
Bellozal	48 u	Polaramine	48 u
(Levo-) Cetirizine	48 u	Postafene	48 u
Merck-Cetirizine	48 u	Relvar	48 u
Cirrus	48 u	Seretide	48 u
Claritine	48 u	Spiriva	48 u
Combivent	8 u	Spirolair	8 u
Doccetri	48 u	Stugeron	48 u
Docsalbuta	8 u	Symbicort	48 u
Duovent	8 u	Telfast	24 u
Estivan	48 u	Theolair	24 u
Foradil	48 u	Ventolin	8 u
Inuvair	48 u	Xanthium	24 u
Longifene	48 u	Xyzall	48 u
Loratadine Bexal	48 u	Zaditen	48 u
Loratadine Teva	48 u	Zyrtec	48 u

1.2 Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U krijgt een knijpertje op de neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. Er wordt een longfunctietest afgenomen, waarbij de longfunctie-assistent(e) u enkele malen zal vragen diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen.

Daarna gaat u via een aerosol-apparaat een histamine-oplossing inademen, waarna opnieuw de longfunctie wordt gemeten. Dit wordt meerdere malen herhaald, telkens met een hogere concentratie histamine.

Aan de hand van de meetresultaten en het eventuele optreden van reacties (kortademigheid, hoessten, piepen) kan worden vastgesteld of uw luchtwegen overgevoelig zijn, alsook hoe ernstig deze overgevoeligheid is.

Dreigt een reactie te hevig te worden, dan wordt tijdig ingegrepen. Het onderzoek wordt dan gestopt, u krijgt onmiddellijk een luchtwegverwijder toegediend, waardoor de reactie in het algemeen ongedaan wordt gemaakt. Tegen het einde van het onderzoek krijgt u altijd een luchtwegverwijder.

Het onderzoek wordt beëindigd als de longfunctie weer helemaal normaal is geworden. Het totale onderzoek kan tot maximaal één uur in beslag nemen. U kunt een lichte vorm van benauwdheid tijdens het onderzoek ervaren, die verdwijnt zodra u de luchtwegverwijder heeft ingeademd.

Na het onderzoek kunt u lichte keelpijn hebben of prikkelhoest. Het onderzoek is soms vermoeiend vanwege het vele blazen, maar is niet gevaarlijk.

02 VRAGEN?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de raadpleging Pneumologie. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur via tel. 089 80 82 62 of via pneumologie@zol.be.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be