



# Injectafer® Behandeling

T +32(0)89 32 50 50  
F +32(0)89 32 79 00  
info@zol.be

**Campus Sint-Jan**  
Schiepse bos 6  
B 3600 Genk

**Campus Sint-Barbara**  
Bessemmerstraat 478  
B 3620 Lanaken

**Medisch Centrum André Dumont**  
Stalenstraat 2a  
B 3600 Genk



Geachte heer,  
Geachte mevrouw,

Uw arts heeft u een behandeling met Injectafer voorgeschreven. Deze brochure geeft u informatie over wat Injectafer is, hoe het werkt en welke nevenwerkingen er kunnen optreden bij deze behandeling.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan uw arts of aan de verpleegkundige.

## INHOUDSTAFEL

- 1. Wat is Injectafer® en waarvoor dient het?** 3
- 2. Waar let u op?** 4
- 3. Vragen** 5

# 01 WAT IS INJECTAFER® EN WAARVOOR DIEN T HET?

De werkzame stof in Injectafer® is ijzer(III)carboxymaltose (een ijzerkoolhydraatverbinding). Injectafer® wordt gebruikt voor het behandelen van patiënten met ijzergebrek wanneer oraal (via de mond) toegediende ijzerpreparaten niet werken of niet worden verdragen. Het doel van de behandeling is het aanvullen van de ijzervoorraden in het lichaam.

We halen ijzer uit de voeding. IJzer is essentieel voor ons lichaam, het is betrokken in tal van centrale processen in ons lichaam. De belangrijkste functie van ijzer is het zuurstoftransport doorheen ons lichaam: ijzer is de belangrijkste bouwstof van hemoglobine dat aanwezig is in de rode bloedcellen.

Zonder ijzer is zuurstoftransport doorheen ons lichaam niet mogelijk. IJzertekort kan aanleiding geven tot anemie (bloedarmoede).

Injectafer® is uitsluitend op voorschrift van de arts verkrijgbaar. Er wordt een bloedafname gedaan om het ijzergehalte in het bloed te controleren. Op basis van dit resultaat bepaalt uw arts welke dosis Injectafer® u nodig hebt, evenals de frequentie en de duur van uw behandeling. Uw (huis)arts zal regelmatig uw ijzerparameters opvolgen, om het effect van de behandeling te meten en ijzerstapeling te voorkomen.

Injectafer® wordt toegediend via een infuus (intraveneus). Het product is een bruine oplossing en wordt in het Dagziekenhuis Geneeskunde toegediend gedurende ongeveer een half uur.

## 02 WAAR LET U OP?

### Breng voor de behandeling de arts op de hoogte over:

- Medicatie die u inneemt of tot voor kort innam.
- Zwangerschap (of vermoeden van).
- Aanwezigheid van infectie.
- Allergieën, voorgeschiedenis van ernstige astma, eczeem of andere atopische allergie, immuun- of inflammatoire aandoening zoals bijvoorbeeld systemische lupus erythematoses, reumatoïde artritis. Bij deze patiënten is het risico op een allergische reactie hoger.

**Overgevoelighedsreacties** zijn zeer zeldzaam. Allergische klachten die kunnen optreden gaan van huiduitslag en jeuk (netelroos), tot kortademigheid en bloeddrukverlaging bij een ernstige allergische reactie.

De verpleegkundige controleert daarom steeds uw bloeddruk, hartslag en temperatuur om eventuele reacties op Injectafer® vast te stellen. Wanneer er een **overgevoelighedsreactie** optreedt tijdens het toedienen, dient de be-

handeling onmiddellijk te worden stopgezet.

- Indien u zich tijdens de behandeling onwel zou voelen, verwittig dan zo snel mogelijk de verpleegkundige. Mocht u zich na de behandeling thuis onwel voelen neem dan contact op met uw (huis)arts.

Zoals elk geneesmiddel kan Injectafer® **bijwerkingen** hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest gemelde bijwerking is hoofdpijn. Ook andere symptomen, zoals duizeligheid, misselijkheid, buikpijn, verstopping (constipatie), diarree, uitslag, reacties op de aanprikplaats kunnen optreden. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van deze bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

## 03 VRAGEN

De toediening van Injectafer® dient **voorzichtig** te gebeuren om lekkage van het product (toediening naast de ader) te voorkomen. Lekkage kan leiden tot irritatie van de huid en mogelijk een langdurige bruine verkleuring van de huid op de plaats van de injectie. Indien u pijn of een zwelling ervaart op de injectieplaats, verwittig dan zo snel mogelijk de verpleegkundige. Wanneer dit optreedt, moet de toediening onmiddellijk gestopt worden.

Voldoende ijzer is essentieel voor een goede gezondheid. We halen ijzer uit de voeding. Een evenwichtige, gevarieerde voeding die voldoende ijzerhoudende voedingsmiddelen (vlees, vis, gevogelte, granen en peulvruchten) en veel groenten en fruit bevat, kan in een adequate ijzerinname voorzien.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan uw (huis-)arts of aan de verpleegkundige.

### **Telefoonnummers waar u terecht kan bij vragen of problemen:**

- Dagziekenhuis Geneeskunde  
089/32 67 92
- Raadpleging Oncologie  
089/32 65 52
- Raadpleging Gastro-Enterologie  
089/32 65 12
- Algemeen nummer Ziekenhuis  
089/32 50 50







[www.ZOL.be](http://www.ZOL.be)



[www.facebook.com/ZOLzh](https://www.facebook.com/ZOLzh)



[www.twitter.com/ZOLziekenhuis](https://www.twitter.com/ZOLziekenhuis)



[www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis](https://www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis)

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via [www.zol.be](http://www.zol.be).