



# Tasigna® - Nilotinib

## Product Informatie Fiche

T +32(0)89 32 50 50  
F +32(0)89 32 79 00  
info@zol.be

**Campus Sint-Jan**  
Schiepse bos 6  
B 3600 Genk

**Campus Sint-Barbara**  
Bessemmerstraat 478  
B 3620 Lanaken

**Medisch Centrum André Dumont**  
Stalenstraat 2a  
B 3600 Genk



Beste patiënt,

Via deze brochure willen we u informeren over het gebruik van Tassigna.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel niet om uw arts te contacteren.

## INHOUDSTAFEL

### 1. Tassigna®

- 1.1 Therapeutisch gebruik
- 1.2 Wijze van toediening
- 1.3 Mogelijke bijwerkingen
- 1.4 Interacties met andere geneesmiddelen
- 1.5 Bewaring
- 1.6 Andere aanbevelingen

# 01 TASIGNA®

Tasigna® caps 150 mg (rood) of  
200 mg (lichtgeel)



## 1.1 Therapeutisch gebruik

Tasigna® wordt gebruikt als behandeling van bepaalde vormen van chronische myeloïde leukemie. CML is een kanker van het bloed wat er voor zorgt dat het lichaam te veel afwijkende witte bloedcellen aanmaakt.

## 1.2 Wijze van toediening

## Wanneer Tasigna innemen?

Neem de harde capsules:

- **tweemaal per dag** in (ongeveer elke 12 uur);



- ten minste **2 uur na voedsel**;
- wacht dan **1 uur voordat u weer gaat eten**.



Als u vragen heeft over wanneer Tasigna in te nemen, ga dan naar uw arts of apotheker. Het innemen van Tasigna elke dag op hetzelfde tijdstip, helpt u zich eraan te herinneren wanneer u uw harde capsules moet innemen.

## Hoe Tasigna in te nemen?

- Slik de harde capsules in het geheel door met water.
- Gebruik geen voedsel samen met de harde capsules.
- Maak de harde capsules niet open tenzij u niet in staat bent om harde capsules door te slikken. In dat geval kunt u de inhoud van elke harde capsule over één theelepel appelmoes strooien. Neem dit direct in. Gebruik niet meer dan één theelepel appelmoes voor elke harde capsule en gebruik hiervoor geen ander voedsel dan appelmoes.



- Tasigna<sup>®</sup> wordt dagelijks ingenomen in 2 innames, telkens ongeveer op hetzelfde tijdstip, steeds zonder een maaltijd.
- Inname met een groot glas water en zonder kauwen.
- De behandeling met Tasigna<sup>®</sup> kan worden voortgezet zolang

u de behandeling verdraagt en de ziekte zich niet verder ontwikkelt.

- Indien u een inname bent vergeten, niet op eigen initiatief inhalen of de volgende inname verdubbelen. Neem uw volgende dosis in zoals gepland.

### 1.3 Mogelijke bijwerkingen

De meeste bijwerkingen van Tassigna® zijn licht tot matig ernstig en zullen in het algemeen na enkele dagen tot enkele weken behandeling verdwijnen.

- Vermoeidheid
- Misselijkheid, diarree, buikpijn, verstopping, gezwollen buik
- Longaandoeningen (moeilijk ademen, hoesten, reutelgeruis met of zonder koorts, zwelling van de voeten of benen)
- Hoofdpijn
- Spierpijn, gewrichtspijn
- Bloedaandoeningen (koorts, snel blauwe plekken krijgen, infecties)
- Huiduitslag, jeuk
- Oogaandoeningen (troebel zicht, bloed in het oog)

- Opstapeling van vocht (snelle toename in gewicht, zwelling van handen, enkel, voeten of gezicht)
- Stolling in een ader (zwelling en pijn in één deel van het lichaam)
- Slapeloosheid, angstgevoelens
- Hartaandoeningen (pijn op borst, hoge bloeddruk, onregelmatige hartslag, blauwe verkleuring van lippen, tong of huid)
- Haarverlies

### 1.4 Interacties met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts als u andere geneesmiddelen inneemt zoals geneesmiddelen bij epilepsie, maagzuurremmers, bloedplaatjesremmers, anticoagulantia, antimycotica, antibiotica, anti-aritmica of sint-janskruid. Deze geneesmiddelen zouden de werkzaamheid of de toxiciteit van uw behandeling kunnen beïnvloeden.

## 1.5 Bewaring

Op kamertemperatuur, op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

## 1.6 Andere aanbevelingen

- Duizeligheid en troebel zicht kunnen optreden tijdens de behandeling met Tasigna®. Gelieve voorzichtig te zijn bij het besturen van een voertuig!
- Vrouwen in de vruchtbare leeftijd zullen een zwangerschap vermijden tijdens hun behandeling.
- Vrouwen mogen geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met Tasigna®.

Bron:  
Bijsluiter Tasigna®  
Samenvatting productkenmerken  
Info Novartis





[www.ZOL.be](http://www.ZOL.be)



[www.facebook.com/ZOLzh](https://www.facebook.com/ZOLzh)



[www.twitter.com/ZOLziekenhuis](https://www.twitter.com/ZOLziekenhuis)



[www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis](https://www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis)

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via [www.zol.be](http://www.zol.be).