



Alecensa® - Alectinib

Product Informatie Fiche

T +32(0)89 32 50 50
F +32(0)89 32 79 00
info@zol.be

Campus Sint-Jan
Schiepse bos 6
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk



Beste patiënt,

Via deze brochure willen we u informeren over het gebruik van Alecensa®.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel niet om uw arts te contacteren.

INHOUDSTAFEL

1. Alecensa®

- 1.1 Therapeutisch gebruik
- 1.2 Wijze van toediening
- 1.3 Mogelijke bijwerkingen
- 1.4 Interacties met andere geneesmiddelen
- 1.5 Bewaring
- 1.6 Andere aanbevelingen

01 ALECENSA®

Alecensa® 150 mg harde capsules
WIT.



1.1 Therapeutisch gebruik

Alecensa® wordt gebruikt als behandeling van sommige soorten van longkanker.

1.2 Wijze van toediening



De gebruikelijke dosering is 2 x 4 capsules van 150 mg per dag.

- Neem 's morgens en 's avonds telkens 4caps in, elke dag ongeveer op hetzelfde tijdstip.
- De capsules moeten in hun geheel met water doorgeslikt worden.
- Ze moeten met voedsel ingenomen worden.
- Capsules niet fijnmaken, oplossen of openen!
- Wees voorzichtig met het drinken van pompelmoessap of het eten van pompelmoes of bittere sinaasappelen, aangezien dit de concentratie van het geneesmiddel in uw lichaam kan veranderen.
- Een gemiste dosis best zo snel mogelijk inhalen, behalve indien minder dan 6 uur tot de volgende dosis.
- Als u moet braken nadat u een dosis Alecensa® heeft ingenomen, neem dan geen extra dosis in maar neem uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.

1.3 Mogelijke bijwerkingen

- Obstipatie, misselijkheid, diarree, braken
- Smaakverandering
- Oedeem (ophoping van vocht)
- Spierpijn
- Stoornissen in het gezichtsvermogen
- Verlaging van het aantal rode bloedcellen (vermoeidheid, zwakte, kortademigheid)
- Vertraagde hartslag (flauwvallen, duizeligheid, lage bloeddruk)
- Verhoogde leverwaarden
- Huiduitslag en lichtgevoeligheid voor zonlicht
- Gewichtstoename

1.4 Interacties met andere geneesmiddelen

Alecensa[®] geeft interactie met veel andere geneesmiddelen. Andere geneesmiddelen kunnen de werking van Alecensa[®] beïnvloeden of Alecensa[®] kan de werking van deze geneesmiddelen beïnvloeden.

Informeer uw arts over alle andere geneesmiddelen die u inneemt,

zodat uw volledig medicatieschema kan nagezien worden.

1.5 Bewaring

Bewaren bij kamertemperatuur, op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

1.6 Andere aanbevelingen

- Langdurige blootstelling aan de zon best vermeden tijdens de behandeling met Alecensa[®]:
- Huid en lippen beschermen met een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor (SPF \geq 50).
- Effectieve anticonceptie moet worden toegepast. Borstvoeding wordt afgeraden.
- Bespreek dit met uw arts.

Bron:
Bijsluiter Alecensa[®]
Samenvatting productkenmerken
Info Roche



www.ZOL.be



www.facebook.com/ZOLzh



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.