



# Kisqali® - Ribociclib

## Product informatie fiche

### **ZOL GENK**

Campus Sint-Jan  
Synaps Park 1  
B 3600 Genk

### Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478  
B 3620 Lanaken

### Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a  
B 3600 Genk

### **ZOL MAAS EN KEMPEN**

Diestersteenweg 425  
B 3680 Maaseik

ZOL GENK  
tel. +32(0)89 32 50 50  
ZOL MAAS EN KEMPEN  
tel. +32(0)89 50 50 50  
info@zol.be

Beste patiënt,

Via deze brochure willen we u informeren over het gebruik van Kisqali®.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel niet om uw arts te contacteren.

## INHOUDSTAFEL

### 1. Kisqali®

- 1.1 Therapeutisch gebruik
- 1.2 Wijze van toediening
- 1.3 Mogelijke bijwerkingen
- 1.4 Interacties met andere geneesmiddelen
- 1.5 Bewaring
- 1.6 Andere aanbevelingen

Inhoudsverantwoordelijke: M. Stragier (Hoofdapotheker) | September 2018

# 01 KISQALI®

Kisqali® 200 mg filmomhulde tabletten – lichtgrijs-violet



## 1.1 Therapeutisch gebruik

Kisqali® wordt gebruikt als behandeling van bepaalde types van borstkanker in combinatie met een aromataseremmer (letrozol) of fulvestrant.

## 1.2 Wijze van toediening

De aanbevolen startdosering is 600 mg (= 3 tabletten van 200 mg).

Mogelijk kan later de dosis aangepast worden.



De Kisqali® tabletten innemen in één inname, één maal per dag met een glas water, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip, bij-

voorkeur 's morgens. Inname mag met of zonder voedsel.

Tabletten niet kauwen of fijnmaken!

Indien u een tablet vergeten bent, neem de volgende dosis volgens het gebruikelijke schema in. Geen dubbele dosis innemen om de vergeten dosis in te halen!

Kisqali® wordt ingenomen gedurende 21 opeenvolgende dagen gevolgd door 7 dagen zonder behandeling.

Indien letrozol samen met ribociclib wordt toegediend, is de aanbevolen dosis letrozol éénmaal daags één tablet van 2.5mg. Deze dosis dient ononderbroken oraal te worden ingenomen.

	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4
<b>KISQALI</b>				NO KISQALI
Aromatase inhibitor				

### 1.3 Mogelijke bijwerkingen

#### Ernstige nevenwerkingen (onmiddellijk arts contacteren!)

- Infecties (koorts)
- Leverproblemen (gele verkleuring van de huid of het oogwit, donkere of bruine urine, sneller dan normaal bloedingen of blauwe plekken, pijn in rechterbovenbuik)

#### Andere vaak voorkomende nevenwerkingen

- Daling van witte bloedcellen (meer vatbaar voor infecties, koorts)
- Daling van rode bloedcellen (vermoeidheid, zwakte, bleek zien)
- Daling van bloedplaatjes (spontane bloedingen of blauwe plekken, neusbloedingen)
- Kortademigheid
- Droge ogen, tranenvloed
- Ontsteking van het mondslijmvlies
- Misselijkheid, braken, diarree, verminderde eetlust, obstipatie, vreemde smaak in de mond
- Huiduitslag, droge huid, jeuk
- Gewichtsverlies

- Haaruitval of dunner wordend haar
- Hoofdpijn
- Gezwollen handen, enkels of voeten
- Verhoogde leverwaarden of nierfunctiewaarden

### 1.4 Interacties met andere geneesmiddelen

#### Voorzichtigheid bewaren bij gelijktijdig gebruik van:

- Geneesmiddelen tegen schimmels (azolen)
- Sommige soorten antibiotica (macroliden)
- Bepaalde geneesmiddelen tegen virussen
- Geneesmiddelen tegen epilepsie (fenytoïne, carbamazepine)
- Geneesmiddelen tegen hartritme stoornissen of hartaandoeningen
- Geneesmiddelen voor de verbetering van de vetgehaltes in het bloed
- Geneesmiddelen bij diabetes
- Sint-Janskruid, pompelmoes en granaatappel vermijden!

Gelieve te bespreken met uw arts.

## 1.5 Bewaring

Op kamertemperatuur, op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

## 1.6 Andere aanbevelingen

- Vrouwen in de vruchtbare leeftijd en hun partner zullen effectieve anticonceptie gebruiken tijdens en nog enige tijd na hun behandeling. Borstvoeding is niet toegestaan tijdens de behandeling.
- Gelieve bij vermoeidheid extra op te letten bij het bedienen van machines en het besturen van voertuigen.
- Als u allergisch bent voor pinda's of soja, mag u dit geneesmiddel niet innemen.
- U mag geen pompelmoezen of granaatappels eten of dit sap drinken tijdens uw behandeling met dit geneesmiddel. Dit beïnvloedt de werking van Kisqali in uw lichaam.

Bron:  
Bijsluiter Kisqali®  
Samenvatting productkenmerken  
Info Novartis







[www.ZOL.be](http://www.ZOL.be)



[www.twitter.com/ZOLziekenhuis](http://www.twitter.com/ZOLziekenhuis)



[www.facebook.com/ZOLzh](http://www.facebook.com/ZOLzh)



[www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis](http://www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis)

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via [www.zol.be](http://www.zol.be)

Raadpleeg online uw medisch dossier via [www.mijnzol.be](http://www.mijnzol.be)