



Lonsurf® trifluridine/tipiracil

Product Informatie Fiche

T +32(0)89 32 50 50
F +32(0)89 32 79 00
info@zol.be

Campus Sint-Jan
Schiepse bos 6
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk



Beste patiënt,

Via deze brochure willen we u informeren over het gebruik van Lonsurf.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel niet om uw arts te contacteren.

INHOUDSTAFEL

- | | |
|---|---|
| 1. Lonsurf® | 3 |
| 1.1 Therapeutisch gebruik | |
| 1.2 Wijze van toediening | |
| 1.3 Mogelijke bijwerkingen | |
| 1.4 Interacties met andere geneesmiddelen | |
| 1.5 Bewaring | |
| 1.6 Andere aanbevelingen | |

Inhoudsverantwoordelijke: M. Stragier (Hoofdapotheker) | September 2018

01 LONSURF®

Lonsurf® tabletten bevatten een combinatie van 2 stoffen (trifluridine en tipiracil). Ze zijn beschikbaar in 2 verschillende dosissen: 15 mg en 20 mg per tablet. Deze tabletten zijn enkel in de ziekenhuisapothek te verkrijgen.



1.1 Therapeutisch gebruik

Lonsurf® wordt gebruikt als behandeling van bepaalde vormen van coloncancer die zijn uitgezaaid naar andere lichaamsdelen.

1.2 Wijze van toediening

Een therapie met Lonsurf® bestaat uit meerdere cycli van telkens 28 dagen. U dient Lonsurf® in te nemen gedurende 2 x vijf dagen gedurende 1 cyclus. Deze inname gebeurt steeds volgens een bepaald schema. Uw arts bepaalt de dosis die u tweemaal per dag zal innemen gedurende 2 x 5 dagen in een volledige cyclus van 28 dagen.

Week 1: van dag 1 tot en met dag 5 inname 2x per dag, dag 6 en 7: geen inname

Week 2: van dag 1 tot en met dag 5 inname 2x per dag, dag 6 en 7: geen inname

Week 3 en 4: géén inname van Lonsurf

WEEK 1 en WEEK 2

		Dag					
		1	2	3	4	5	6-7
... mg 's morgens	... x tabletten van 15 mg Lonsurf						Geen inname
	... x tabletten van 20 mg Lonsurf						
... mg 's avonds	... x tabletten van 15 mg Lonsurf						Geen inname
	... x tabletten van 20 mg Lonsurf						

- Inname van de tabletten tweemaal per dag.
- Inname van de tabletten bij de maaltijd, ten laatste 1 uur na het ontbijt en 1 uur na het avondeten.
- Inname van de tabletten telkens ongeveer op hetzelfde tijdstip.
- De tabletten moeten in hun geheel met water worden doorgeslikt, zonder kauwen.
- Als u moet braken na het innemen van Lonsurf®, mag u geen extra

tabletten innemen. Neem de volgende dosis gewoon in op het geplande tijdstip.

- Indien u een inname bent vergeten, sla die dan over en neem de volgende dosis gewoon in op het geplande tijdstip.
- Vertel het aan uw arts als u een dosis heeft overgeslagen.

1.3 Mogelijke bijwerkingen

Ernstige nevenwerkingen

- Koorts of tekenen van een infectie (rillingen, zweten, hoesten, keelpijn, diarree)
- Duizelig, kortademig, pijn in de borstkas
- Bloeding (symptomen: bloedneus, blauwe plekken, bloed ophoesten of braken, bloed in de urine of in de ontlasting of donkergekleurde (zwarte) ontlasting)
- Ernstig vermageren of uitdrogen (dorst, droge mond, droge gerimpelde huid, weinig plassen)

Contacteer uw arts onmiddellijk!

Eveneens mogelijk voorkomend:

- Vermoeidheid
- Vermindering van rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (bloedingen, blauwe plekken)
- Infecties, vooral luchtweginfecties (kortademigheid, hoest)
- Diarree, misselijkheid, braken, buikpijn, constipatie, gewichtsverlies, verminderde eetlust, veranderde smaak
- Ontsteking van het mondslijmvlies
- Slapeloosheid, angst
- Hoofdpijn, duizeligheid
- Haarverlies (uw haar kan dunner worden)
- Huiduitslag, jeuk, droge huid, roodkleuring van zwelling en pijn aan handpalm en voetzolen
- Zwelling van handen, benen en voeten

- Veranderde labowaarden van het bloed (vb. verhoogd bilirubine).

1.4 Interacties met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts als u andere geneesmiddelen inneemt, deze geneesmiddelen zouden de werkzaamheid of de toxiciteit van uw behandeling kunnen beïnvloeden.

1.5 Bewaring

Op kamertemperatuur, op een veilige plaats buiten het zicht en bereik van kinderen.

1.6 Andere aanbevelingen

- Vrouwen in de vruchtbare leeftijd zullen een zwangerschap vermijden tijdens hun behandeling.
- Vrouwen mogen geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met Lonsurf®.
- Effectieve contraceptie moet gebruikt worden zowel bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd als bij mannen tijdens de behandeling.

Bron:

Bijsluiter Lonsurf®

Samenvatting productkenmerken

Info Servier



www.ZOL.be



www.facebook.com/ZOLzh



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.