



# Emla®

## Toverzalf

T +32(0)89 32 50 50  
F +32(0)89 32 79 00  
info@zol.be

**Campus Sint-Jan**  
Schiepse bos 6  
B 3600 Genk

**Campus Sint-Barbara**  
Bessemersstraat 478  
B 3620 Lanaken

**Medisch Centrum André Dumont**  
Stalenstraat 2a  
B 3600 Genk



Beste ouder(s),  
Beste patiënt,

U vernam van uw arts dat er bij u EMLA zelf aangebracht wordt als lokale verdoving van de huid. Deze brochure geeft u meer informatie over deze procedure en probeert op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende arts en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

## INHOUDSTAFEL

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>1. Wat is EMLA®?</b>            | <b>3</b> |
| 1.1 Wanneer wordt EMLA® gebruikt ? |          |
| 1.2 Hoe EMLA® gebruiken?           |          |
| 1.3 EMLA® aanbrengen               |          |
| 1.4 Gebruiksaanwijzing             |          |

# 01 WAT IS EMLA®?

EMLA® staat voor Eutectic Mixture Lidocaine and Prilocaine. Lidocaine en Prilocaine zijn de 2 werkzame stoffen in deze crème die er voor zorgen dat er een lokale verdoving van de huid ontstaat, op de plaats waar de crème werd aangebracht. Uw kind gaat nagenoeg geen pijn meer voelen.

EMLA® is verkrijgbaar in een tube van 5mg of in kant-en-klare vorm door middel van een pleister waar reeds EMLA® op aangebracht werd. Het kan voor alle leeftijden gebruikt worden.

## 1.1 Wanneer wordt EMLA® gebruikt ?

EMLA® is een geneesmiddel en wordt door de apotheek afgeleverd volgens een medisch voorschrift.

EMLA® kan gebruikt worden voorafgaande aan een bloedafname, infuus prikken, intradermale inspuiting, lumbale punctie,... EMLA® mag nooit gebruikt worden op plaatsen waar de huidbarrière beschadigd is. Dus niet op een open wonde.

## 1.2 Hoe EMLA® gebruiken?

- De arts of verpleegkundige zal aangeven waar u de crème moet aanbrengen.
- Gebruik niet meer EMLA® dan voorgeschreven werd door de arts.
- Wanneer u de crème heeft aangebracht uit een tube, wordt hierop nog een occlusieve pleister (= volledig afgesloten van de lucht) aangebracht.
- Nadien windelt u het lichaamsdeel, waar de crème op aangebracht werd, in. Zo verhindert u het accidenteel loskomen van de pleister. Laat de pleister minstens 1 uur maar niet langer dan 4 uur zitten.
- De crème moet afgeschermd worden van de lucht, anders verliest de crème het verdovend effect.

## 1.3 EMLA® aanbrengen

- Meld datum en tijdstip op de aangebrachte pleister.

Dag: .....

Tijdstip: .....

## 1.4 Gebruiksaanwijzing

### Crème

1. Was uw handen en droog ze af.
2. Breng EMLA® crème aan op de plaats die de arts/verpleegkundige met u heeft afgesproken zonder deze aan te raken met uw vingers.
3. Breng de pleister aan (volledig afsluiten van omgevingslucht).
4. Druk de pleister aan de buitenzijde aan, niet op de zalf duwen!
5. Windel het lichaamsdeel waarop EMLA® aangebracht werd in met verband.

### Patch

Er kan ook een EMLA® patch gebruikt worden. Het aanbrengen is eenvoudiger omdat de zalf reeds op een pleister werd aangebracht. Na het bevestigen van de pleister brengt u ook een verband aan ter hoogte van de patch. Zo kan er geen omgevingslucht met de zalf in aanraking komen. Verwijderen van bescherm-laag EMLA® patch, aangebracht op elleboogplooi (kan ook op handrug gebruikt worden).









[www.ZOL.be](http://www.ZOL.be)



[www.facebook.com/ZOLzh](https://www.facebook.com/ZOLzh)



[www.twitter.com/ZOLziekenhuis](https://www.twitter.com/ZOLziekenhuis)



[www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis](https://www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis)

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via [www.zol.be](http://www.zol.be).