



Rapydan

toverpleister

T +32(0)89 32 50 50
F +32(0)89 32 79 00
info@zol.be

Campus Sint-Jan
Schiepse bos 6
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk



Beste patiënt,
Beste ouder(s),

Deze brochure geeft u meer informatie over de werking van Rapydan en probeert op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende arts en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

Inhoudsverantwoordelijke: dr. W. Arts (Pediater) |
November 2018

INHOUDSTAFEL

- 1. Wat is Rapydan?** **3**
 - 1.1 Wanneer wordt Rapydan® gebruikt?
 - 1.2 Hoe Rapydan® gebruiken?
 - 1.3 Hoe Rapydan® aanbrengen?

01 WAT IS ROPYDAN®?

Rapydan® is een pleister op basis van Lidocaïne en tetracaïne. Deze stoffen zorgen voor een lokale verdoving van de huid. Door het ontstaan van warmte gaan de bloedvaten meer openstaan en worden de bloedvaten beter zichtbaar op de plaats waar de pleister plakt. De pleister is geschikt vanaf de leeftijd van 3 jaar. Door het plakken van de pleister gaat uw kind nagenoeg weinig pijn voelen.

Rapydan® is verkrijgbaar in een kant-en-klare vorm door middel van een pleister/patch waarop reeds Rapydan aangebracht werd.

1.1 Wanneer wordt Rapydan® gebruikt?

Rapydan® is een geneesmiddel en wordt door de apotheek afgeleverd volgens een medisch voorschrift.

Rapydan® kan gebruikt worden voorafgaand aan een bloedafname, infuus prikken, intradermale inspuiting, lumbale punctie, ... Rapydan® mag nooit gebruikt worden op plaatsen waar de huidbarrière beschadigd is, dus niet op een open wonde.

1.2 Hoe Rapydan® gebruiken?

- De arts of verpleegkundige zal aangeven waar u de patch mag aanbrengen.
- Gebruik niet meer Rapydan dan werd voorgeschreven door de arts.
- Open de verpakking pas wanneer de pleister geplakt gaat worden en niet eerder, omdat de patch verwarmt vanaf blootstelling aan de lucht.
- Dek de patch niet af.
- Raak de binnenkant van de pleister niet aan.
- Laat de patch minstens 30 minuten plakken maar zeker niet langer dan 60 minuten.
- Na het verwijderen van de patch houdt de verdovende werking nog 2 uur aan.
- Meld steeds datum en tijdstip van het aanbrengen van de patch.

Patch:

Dag: ... / ... /

Tijdstip: u

1.3 Hoe Rapydan® aanbrengen?

- Was uw handen en droog ze af.
- Was de huid waar de patch moet plakken.
- Open de verpakking. Raak de binnenkant van pleister/patch niet aan.
- Breng de patch onmiddellijk aan op de plaats die de verpleegkundige met u heeft afgesproken. bvb. ter hoogte van de elleboogplooi, bvb. op de hand
- Druk de randen van de patch stevig aan, zodat deze goed op de huid plakt.
- Druk voorzichtig op het midden van de patch om er zeker van te zijn dat het geneesmiddel contact maakt met de huid.
- Noteer het tijdstip van opplakken.
- Niet afdekken (warmte).
- Verwijder de patch na 60 minuten.



www.ZOL.be



www.facebook.com/ZOLzh



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.