

Ziekenhuis
Oost-Limburg

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Campus Maas en Kempen
Medisch Centrum André Dumont



Aërosol/Puff

campus Maas en Kempen

T +32(0)89 32 50 50
F +32(0)89 32 79 00
info@zol.be

Campus Sint-Jan
Schiepse bos 6
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemerstraat 478
B 3620 Lanaken

Campus Maas en Kempen
Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk



Beste ouder(s),

U vernam van uw arts dat u een Aërosol/Puff moet gebruiken.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende arts en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1. Waarom?	3
2. Hoe gaat dit in zijn werk?	4
2.1 Puff	
2.2 Aërosol	
3. Tips voor ouders	5
4. Contact	5

01 WAAROM?

Om de medicatie rechtstreeks in de luchtwegen en de longen te brengen, wordt deze verneveld door middel van inhalatietherapie. Inhalatietherapie kan op twee manieren gebeuren: door middel van een puff met een voorzetkamer of door middel van een aërosol met een aërosoltoestel. De dokter bepaalt welke methode de beste is voor uw kind.

De inhalatietherapie kan op twee manieren gebeuren: door middel van een puff met een voorzetkamer of door middel van een aërosol met een aërosoltoestel. De dokter bepaalt welke methode de beste is voor uw kind.



02 HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK?

2.1 Puff

Laat uw kind(je) rechtop zitten. Het masker van de voorzetkamer wordt over de neus en de mond gezet. Vervolgens wordt er een puffje gegeven. Het medicament verdeelt zich in de buis. Nu moet uw kind 10 keer in- en uitademen (ongeveer 10 tellen). Bij de meeste voorzetkamers zie je dan een klepje op en af bewegen. Soms schrijft de dokter 2 puffjes voor, dan herhalen we dit nog een keer.

Zorg dat uw kind(je) rustig rechtop zit. De verpleegkundige (of de ouder) doet de medicatie in een apparaat. Het masker wordt over neus en mond gezet en vastgehouden door uzelf of uw kind. De verpleegkundige of ouder zet het toestel aan. Wanneer er géén damp meer uitkomt (na 10-tal minuten), mag u het masker weer afnemen.

2.2 Aërosol

Zorg dat uw kind(je) rustig rechtop zit. De verpleegkundige (of de ouder) doet de medicatie in een apparaat. Het masker wordt over neus en mond gezet en vastgehouden door uzelf of uw kind.

03 TIPS VOOR OUDERS

De verpleegkundige of ouder zet het toestel aan. Wanneer er géén damp meer uitkomt (na 10-tal minuten), mag u het masker weer afnemen.



- Een aërosolmoment met een aërosoltoestel duurt ongeveer 10 minuten. Dit kan voor een kind lang zijn. Moedig uw kind aan om rustig te blijven zitten.
- Een klein kind kan u best proberen af te leiden en eventueel een tutje geven. Een groter kind kan u betrekken bij de behandeling door het zelf het masker te laten vasthouden.
- Indien het niet alleen lukt, mag u altijd de hulp inroepen van een verpleegkundige. Hij of zij kan u tips geven.
- Probeer uw kind achteraf een beetje water of melk te laten drinken. Grotere kinderen kunnen hun mond spoelen.
- U dient de voorzetkamer regelmatig af te wassen in een sopje en dan aan de lucht te laten drogen.

Wij wensen uw kind van harte een spoedig herstel toe.

04 CONTACT

Algemeen nummer: tel. 089 50 50
50

Kinderafdeling: tel. 089 50 63 22

E-mail: info@zmk.be



www.ZOL.be



www.facebook.com/ZOLzh



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.