

ZOL GENK
Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Halsklieerevidement

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 32 50 50
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

U vernam van uw arts dat u een halsklierevidement moet ondergaan. Deze informatiebrochure geeft u meer achtergrond informatie over deze procedure en tracht op een aantal veel gestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelend arts en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1. Wat is een halsklierevidement?

- 1.1 Indicaties
- 1.2 De ingreep
- 1.3 Normaal postoperatief verloop
- 1.4 Alarmsymptomen

2. Tot slot

01 WAT IS EEN HALSKLIEREVIDEMENT?

Een halsklierevidement of halsklieruitruiming is een chirurgische ingreep waarbij de lymfeklieren en lymfebanen uit geselecteerde halsregio's worden verwijderd.

1.1 Indicaties

- Bij hoofd-halstumoren waarbij er kankercellen in de lymfeklieren van de hals zijn terechtgekomen.
- Preventief bij bepaalde tumoren die een verhoogd risico hebben op uitzaaiing naar de lymfeklieren.

1.2 De ingreep

- De ingreep gaat door onder **volledige verdoving**. Dit betekent dat u nuchter moet zijn vanaf middernacht. Dit wil zeggen dat u niet meer mag eten, drinken, snoepen of roken vanaf middernacht, tenzij anders vermeld op uw opnameformulier.
- Tijdens de ingreep wordt er een insnede gemaakt ter hoogte van de hals waarna de lymfeklieren voorzichtig worden verwijderd. De plaats en de grootte van de incisie is af-

hankelijk van welke halsregio's verwijderd moeten worden. Nadien worden er één of twee drains in het operatiegebied achtergelaten om het bloed en wondvocht, dat zich daar nog verzamelt, af te voeren.

- Na de operatie blijft u gemiddeld **2 tot 3 dagen** in het ziekenhuis. De hospitalisatieduur is afhankelijk van het type ingreep, uw klinische toestand en de hoeveelheid wondvocht.

1.3 Normaal postoperatief verloop

- Achteraf is er over het algemeen weinig pijn te verwachten. Na de ingreep kan u pijn voelen bij het slikken. Hiervoor zal pijnmedicatie worden voorzien.
- Ter preventie van een bloedingstoring en benauwdheid kan een drain worden geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid bloed en wondvocht kan deze na enkele dagen verwijderd worden.
- Wondzorg: Het litteken ter hoogte van de hals dient goed droog gehouden te worden. De steristrips (dunne wondhecht-

pleisters), die aangebracht worden ter hoogte van het litteken, worden best gedurende 1 week ter plaatse gehouden.

- Tijdens de operatie is het niet altijd mogelijk om de gevoelszenuwen van de huid in de hals te sparen. Dit veroorzaakt een verdoofd gevoel ter hoogte van de hals. Gewoonlijk verbetert dit geleidelijk na de ingreep.- Bij het verwijderen van lymfeklieren worden de aanliggende zenuwen zorgvuldig opgezocht en gespaard. Elke aanraking van een zenuw kan een zwelling veroorzaken, waardoor de zenuw na de operatie (meestal) tijdelijk niet goed functioneert. Een niet of slecht functionerende zenuw, die tijdens de operatie volledig intact is gebleven, herstelt zich in de loop van enkele weken tot maanden. Welke zenuwen er mogelijk kunnen aangetast kunnen worden, is afhankelijk van welke lymfeklieren er worden weggenomen. Dit zal worden meegedeeld door uw behandeld arts.

Verwachte **afwezigheid** van werk: 2 weken.

Post-operatieve controle bij KNO-arts: na 1 week: ter verwijdering van de hechtingen en ter bespreking van de resultaten van het weefselonderzoek.

1.4 Alarmsymptomen

- Hevige, aanhoudende **pijn** ondanks pijnstillers.
- **Ademnood.**
- **Infectie:** Bij ontwikkelen van zwelling, roodheid, warmte ter hoogte van het litteken en/of koorts > 38 °C dient U contact op te nemen met uw huisarts of KNOarts van wacht. Zo nodig kunnen antibiotica gestart worden.

02 TOT SLOT

Het volledige zorgteam van NKO, zal trachten u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons weten.

Wij zijn er om u te helpen!

Heeft u opmerkingen bij deze brochure?

Geef ons gerust een seintje!

Contactpersoon secretariaat NKO
Tel. 089 32 60 62



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be