


ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



AVD- Brentuximab vedotin

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

In samenspraak met uw arts werd besloten om een behandeling met Adcetris® op te starten.

In deze brochure staan in het kort de mogelijke bijwerkingen opgesomd en enkele adviezen die u kunnen helpen om beter om te gaan met deze bijwerkingen.

Indien u bijwerkingen van de behandeling ondervindt, meldt u dit best aan uw behandelende arts bij een volgende consultatie of aan de verpleegkundige.

INHOUDSTAFEL

1. Inleiding	3
1.1 Hoe verloopt de behandeling?	
1.2 Aandachtspunten	
1.3 Mogelijke nevenwerkingen	
1.4 Nevenwerkingen voorkomen	
1.5 Raadpleeg uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige	
1.6 Omkadering	

01 INLEIDING

AVD-Bentruximab is een afgekorte benaming voor uw behandeling. Deze bestaat uit drie celremmende geneesmiddelen (chemotherapeutica): Doxorubicine (Adriamycine®), Vinblastine (Velbe®) en Dacarbazine (DTIC®).

De werkzame stof van (Adcetris®) is Brentuximab vedotin. Dit geneesmiddel bestaat uit een monoklonaal antilichaam dat gebonden is aan een stof die bedoeld is om kankercellen te doden. Dit geneesmiddel is een antilichaam-geneesmiddelconjugaat. Dit wil zeggen dat Adcetris zich gaat vasthechten aan bepaalde eiwitten op de wand van de tumorcellen: het bindt namelijk aan CD30 op CD30-positieve tumorcellen. Zo kan het een cytotoxische stof (chemo) afleveren binnen in de kankercel. Hierdoor zal de groei van de tumorcellen gehinderd worden.

Daarnaast worden er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

1.1 Hoe verloopt de behandeling?

Voor de start van de chemotherapie zal er bij u een poortkatheter of picc-katheter geplaatst worden. Uw arts zal dit met u bespreken.

Eén cyclus (of kuur) wordt éénmaal per 4 weken (28 dagen) voorgeschreven. Een volgende cyclus start in principe 4 weken na de vorige toediening, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten. Op dag 1 zal u voor 2 dagen en 1 nacht opgenomen worden in het ziekenhuis. De kuur kan ook via daghospitalisatie toegediend worden.

In het geval dat u een poortkatheter (of picc-katheter) heeft, wordt deze hiervoor gebruikt. Anders zal de verpleegkundige een katheter plaatsen in uw arm.

Vóór elke toediening van Adcetris® zal u geneesmiddelen krijgen ter preventie van koorts en/of een allergische reactie (paracetamol, cetirizine en/of corticoïden).



Onderstaand schema geeft een overzicht van één cyclus. De witte zone stelt de planning van de ziekenhuisopname voor. De grijze zone geeft aan welke medicatie u nadien thuis hoort in te nemen. Deze zal u van de verpleging mee naar huis krijgen.

Chemotherapie	dag								Duur van toediening
	1	2	3	4-14	15	16	17	18-28	
Doxorubicine	Infuus				Infuus				30 min
Da-carbazine	Infuus				Infuus				20 min
Vinblastine	Infuus				Infuus				15 min
Adcetris®	Infuus				Infuus				30 min
aanvullende medicatie									Inname
Kytril 1mg	Tablet	Tablet	Tablet		Tablet	Tablet	Tablet		2x/dag 30 minuten voor de maaltijd

Op dag 1 krijgt u vooraf aan de chemotherapeutica via het infuus Liti-can® en/of Kytril® toegediend. Deze medicatie werkt preventief tegen misselijkheid en braken.

Wanneer u naar huis gaat, krijgt u tabletten Kytril® 1 mg mee. Deze moet u de 2 volgende dagen thuis 's ochtends en 's avonds 30 minuten voor de maaltijd innemen.



Mogelijks schrijft de arts u één of meerdere Filgrastim spuitjes voor. De correcte toedieningsdata zullen met u besproken worden. Deze spuitjes worden onderhuids toegediend. Dit wordt meestal door een thuisverpleegkundige uitgevoerd. Het doel van hiervan is om de kans op infecties te verkleinen. Het aantal witte bloedcellen zal na de chemobehandeling dalen tot op een laag punt, deze periode noemen we nadir. De witte bloedcellen staan in voor de afweer. Door de periode waarin het aantal witte bloedcellen laag is te verkorten, verkleint de kans op infecties.

Filgrastim moet thuis in de frigo bewaard worden. Na toediening kan u botpijn in rug en bekken ervaren. Ook pijn ter hoogte van de injectieplaats en pijn in de gewrichten en spieren is mogelijk.

1.2 Aandachtspunten

- Misselijkheid en braken kan een erg opvallende nevenwerking zijn. Er bestaan verschillende geneesmiddelen om dit te verbeteren. Vraag er naar bij uw behandelend arts.
 - Litican (infuus of pil) inname kan in het ziekenhuis en thuis. Een attest voor verhoogde terugbetaling kan u verkrijgen.
 - Kytril (infuus of pil) of Zofran (infuus, pil, smelttablet). Deze medicatie is vooral werkzaam tijdens een 2 à 3-tal dagen na de chemotherapie.
 - Kytril/Zofran kan vervangen worden door Emend (1 pil gedurende 3 dagen).
 - Kytril/Zofran kan vervangen worden door Akynzeo (1 pil, eenmalig).
 - Solu-medrol (infuus) kan ook helpen tegen misselijkheid/braken.
 - Benzodiazepines zoals Temesta (smelttablet) of Xanax/alprazolam (pil) kunnen helpen wanneer dit thuis voor vertrek naar het ziekenhuis wordt ingenomen. Het is erg belangrijk dat u er dan zeker voor zorgt dat iemand anders u vervoert, zodat dat u niet zelf met de auto rijdt.
- Doxorubicine kan roodverkleuring van urine en traanvocht veroorzaken en dit tot enkele dagen na de therapie. Dit is volkomen onschuldig en verdwijnt spontaan. De medicatie is ook verantwoordelijk voor volledige haaruitval (start meestal >3weken na de eerste cyclus). Indien gewenst kan u voor deze periode een pruik of hoofddeksel aanschaffen. De sociaal verpleegkundige heeft een adressenlijst zodat u weet waar u terecht kan om deze aan te kopen. Als u een voorschrift indient bij de mutualiteit heeft u recht op financiële tussenkomst. Deze medicatie is irriterend voor uw aders. Daarom wordt een centrale katheter voorzien. Dit kan een PICC (perifeer ingebrachte centrale katheter) of poortkatheter zijn.



Tijdens de behandeling met Doxorubicine kan er ook een toxisch effect zijn voor het hart. De hartfunctie wordt daarom voor de therapie gecontroleerd. Indien nodig wordt dit tijdens en na de behandeling verder opgevolgd.

- AVD geeft zelden invloed op de vruchtbaarheid. Voor vrouwen wordt aangeraden anticonceptie te voorzien om zwangerschap tijdens de behandeling en hevige menstruatie door een tekort aan bloedplaatjes, te voorkomen. Het inwinnen van gynaecologisch advies voor de start van de chemotherapie voor vrouwen in de vruchtbare fase is mogelijk. Voor mannen met een (toekomstige) kinderwens wordt aangeraden om spermacellen te laten invriezen. Uw arts zal dit met u bespreken.
- De medicatie tegen braken (Kytril, Zofran) kunnen obstipatie veroorzaken. Een laxeermiddel kan preventief genomen worden de eerste 4-5 dagen van elke kuur.



Het is belangrijk dat u uw medicatie blijft innemen zoals aangegeven wordt door uw arts. De medicatie is immers een belangrijk onderdeel van uw behandeling.

- Als u wordt behandeld met Adcetris kan er zich ondanks de preventieve maatregelen toch een infusiereactie plaatsvinden.



- Koorts
- Rillingen
- Huiduitslag
- Opvliegers
- Ademhalings-
moeilijkheden
- Hoofdpijn
- Hartkloppingen
- Spierstijfheid
- Vermoeidheid
- Keelirritatie
- Misselijkheid en
braken

**Indien u een of
meerdere reac-
tie(s) ervaart,
moet u de ver-
pleegkundige
verwittigen!**

Indien er bij u een reactie ontstaat, zal het infuus vertraagd of onderbroken worden. Bijgevolg geeft de arts het nodige advies voor het verderzetten van de behandeling. Het risico op mogelijke reacties verkleint meestal bij volgende toedieningen.

1.3 Mogelijke nevenwerkingen

- Verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Misselijkheid en braken
- Vermoeidheid en verminderde conditie (kan langdurig ervaren worden)
- Diarree of obstipatie
- Haarverlies
- Reuk- en smaakverandering en minder eetlust
- Irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- Perifere neuropathie (tintelingen of een voos gevoel in vingers, tenen en/of voetzool)

1.4 Nevenwerkingen voorkomen

- Infecties voorkomen
- Voorgeschreven medicatie innemen
- Voldoende drinken
- Rust en activiteit in evenwicht bewaren
- Goede mondhygiëne
- Wondjes voorkomen
- Huidverzorging

1.5 Raadpleeg uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige

- Wanneer u veranderingen waarneemt in uw mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes in uw mond (tong, wangslimvliezen).
- Indien u pijn hebt in uw mond of keel.
- Wanneer u nog moeilijk kunt eten en op korte tijd veel gewicht verliest.
- Wanneer u de dagen na de chemo koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen heeft, wordt verwacht dat u de dag zelf nog contact neemt met uw huisarts (of dienst Spoedgevallen).
- Als u meer dan twee dagen diarree heeft of moet braken
- Wanneer u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.
- Indien er spontaan blauwe plekken ontstaan op uw lichaam, u regelmatig moeilijk een bloedneus kan stelpen of uw menstruatie verlengd is. Ook als u bloed moet braken of bloed in de urine ziet.
- Wanneer u aanhoudende krampende pijn of druk in de borstkas heeft.
- Als u zich duizelig voelt, kortademig bent of u zich moe voelt bij de minste inspanning.



Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen die niet zijn voorgeschreven of aanbevolen door uw arts. Indien u koorts ($>38^{\circ}\text{C}$) heeft, raden wij aan om onmiddellijk de huisarts te verwittigen of u te begeven naar de spoedgevallen

1.6 Omkadering

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, de verpleegkundig consulent, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste en de psycholoog werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met:

- De verpleegkundig consulent hematologie: 089 80 63 66
- Verpleegafdeling oncologie en hematologie (K45): 089 80 63 30
- Dagkliniek geneeskunde: 089 80 83 40
- Secretariaat oncologie en hematologie: 089 80 83 30
- Buiten de werkuren via de telefooncentrale van het Ziekenhuis Oost-Limburg (089 80 80 80) of dienst Spoedgevallen.

Succes met de behandeling



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be