

Beste patiënt,  
In samenspraak met uw arts werd beslist om een behandeling met Avastin (Bevacizumab) te starten voor de behandeling van een hersentumor.

## AVASTIN® (BEVACIZUMAB)

Bevacizumab is een monoklonaal antilichaam dat kan zorgen voor het stilvallen van de tumorgroei door het blokkeren van de groei van de bloedvaten die de tumor voorzien van zuurstof en voedingsstoffen.

### HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

#### Eén cyclus duurt 3 weken (21 dagen)

- Opname op dagziekenhuis Oncologie (GDK1) waar ook een eventuele bloedname gebeurt
- De toediening gebeurt via een infuus
- De eerste twee keer wordt de bevacizumab langzamer toegediend (in 60-90 min) om te kijken of u het middel goed verdraagt
- De daarop volgende kuren zal de toediening 30 min duren
- Elke 3 weken krijgt u een afspraak op dagkliniek en oncoloog, soms voorafgegaan door een bloedname en urinestaal

**Telkens na 3 cycli wordt er een MRI en een controle-raadpleging bij de neurochirurg en oncoloog vastgelegd. Als deze geruststellend is wordt de behandeling verder gezet. De duur van de behandeling hangt af van het effect van de therapie en hoe u de behandeling verdraagt.**

### MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

- Vermoeidheid
- Hoge bloeddruk: door bevacizumab kan u last hebben van een verhoogde bloeddruk. Regelmatige controle is aangewezen, ook in de thuissituatie. Aangeraden wordt om éénmaal per dag de bloeddruk te controleren. Een verhoogde bloeddruk dient verder opgevolgd te worden en wordt steeds gemeld aan uw arts. Mogelijk krijgt u medicatie tegen verhoogde bloeddruk. De toediening van een volgende dosis kan pas plaatsvinden als uw bloeddruk voldoende gezakt is.
- Wondgenezing: bevacizumab verstoort de normale wondgenezing. Het is belangrijk dat u tandextracties of eventuele heelkundige ingrepen met uw arts bespreekt. Ook eventuele wondjes worden best besproken met uw arts zodat een gepaste verzorging kan voorgesteld worden.
- Trombose/embolie: u heeft een iets hoger risico om een trombose of flebitis te ontwikkelen tijdens de behandeling met bevacizumab. Contacteer uw arts bij een pijnlijke en/of gezwollen arm of been.
- Bloedingen: bij toediening van bevacizumab kunnen bloedingen van het slijmvlies (vooral neusbloe-

dingen) optreden. Als u het bloeden niet gestopt krijgt kan u best uw arts contacteren.

- Proteinurie: dit wil zeggen dat het eiwitgehalte in de urine verhoogd kan zijn. Daarom zal uw urine vóór elke toediening gecontroleerd worden.
- Een allergische reactie (zelden): Als die zich toch voordoet is dat meestal tijdens de eerste toediening terwijl u nog in het ziekenhuis bent. Een reactie kenmerkt zich door huiduitslag, al dan niet in combinatie met jeuk, een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, koorts of koude rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat u dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan een verpleegkundige of een arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.

**Bij koorts >38° of erg ziektegevoel: huisarts of dokter van wacht raadplegen of naar dienst Spoedgevallen komen**

## AANDACHTSPUNTEN

---

Bij wondproblemen (roodheid, zwelling of pijn thv de wonde) een afspraak maken op de wondraadpleging Neurochirurgie 089/807420

## CONTACTGEGEVENS

---

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, sociaal verpleegkundige, verpleegkundig consulente, diëtiste, psychologe werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject komt u met elk van hen in contact.

Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met:

- secretariaat Neurochirurgie:  
089/807420
- secretariaat Oncologie: 089/808330
- sociaal verpleegkundige:  
089/806853
- verpleegkundig consulente Neuro:  
089/806362
- psychologe: 089/806057
- buiten de werkuren via de telefooncentrale van het ziekenhuis:  
089/808080 of de dienst Spoedgevallen

## SUCCES MET DE BEHANDELING!

---