

Beste patiënt,
In samenspraak met uw arts werd beslist om een doelgerichte therapie te starten (trastuzumab oftewel Herceptine) voor de behandeling van een HER-2 positieve borstkanker.

TRASTUZUMAB (HERCEPTINE®)

HOE WERKT UW BEHANDELING?

De werkzame stof van Herceptine is trastuzumab. Het kan gegeven worden met een andere doelgerichte therapie en/of wordt vaak al opgestart tijdens de chemotherapie. Trastuzumab is een monoklonaal antilichaam. Het is een geneesmiddel dat zich vasthecht op bepaalde receptoren (HER-2 eiwitten) op de wand van de tumorcellen. Door de vasthechting van trastuzumab gaat de groei van kankercellen geremd worden en gaan ze uiteindelijk afsterven.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING ?

De toediening gebeurt op de dagkliniek geneeskunde (GDK1) en gebeurt door een trage inspuiting in de dij. De behandeling krijgt u om de 3 weken. Een bloedafname is niet nodig tenzij er ook chemotherapie wordt gegeven.

AANDACHTPUNTEN

Een infuusreactie doet zich zelden voor. Als ze toch voorkomt, is dat meestal tijdens de eerste toediening terwijl je nog in het ziekenhuis bent. Een infuusreactie kenmerkt zich door:

- huiduitslag al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over heel het lichaam)
- een gevoel van benauwdheid
- lage bloeddruk
- koorts of rillingen
- misselijkheid
- overmatig transpireren

Het is belangrijk dat u dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige van de dagkliniek of aan de arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

- Vermoeidheid
- Diarree (In combinatie met pertuzumab; 10% van de patiënten)
- Huiduitslag
- Hartproblemen, namelijk een verminderde pompfunctie van het hart. Daarom wordt er tijdens de behandeling een echografie van het hart uitgevoerd.

WAT DOEN ALS ER NEVENWERKINGEN ZIJN

Bij volgende nevenwerkingen adviseren we dat u contact neemt met uw huisarts of borstverpleegkundige/ verpleegkundig consulent.

Enige zwelling tijdens de inspuiting is normaal. Het kan zijn dat uw huid tijdelijk wat roder, harder of gevoeliger wordt in de buurt van de injectieplaatsen.

- Aanhoudende kramp of pijn op de borstkas. Hoge of onregelmatige hartslag
- Kortademigheid
- **Koorts vanaf 38°C**

CONTACTGEGEVENS

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig consulenten, de diëtiste en de psycholoog werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kan u steeds contact opnemen met de borstverpleegkundigen/verpleegkundig consulenten **089/ 80 63 70** - borstverpleegkundige@zol.be, dagziekenhuis oncologie **089/ 80 83 40** of de raadpleging **089/ 80 83 30**.

Bij problemen buiten de werkuren kunt u bellen naar de telefooncentrale van ZOL 089/ 80 80 80 of de spoeddienst.

SUCCES MET DE BEHANDELING !

Productnaam	Therapie om de drie weken		Duur
	Dag 1 - dagkliniek	Dag 2-21	
Herceptine (trastuzumab)	1 inspuiting		Trage inspuiting