

Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om chemotherapie te starten (Carboplatine) voor de behandeling van een pelviene kanker.

## CARBOPLATINE MONO

### HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De toediening wordt georganiseerd op de dagzaal oncologie en gebeurt via verschillende infusen. Carboplatine wordt soms in combinatie gegeven met een gerichte therapie. Het schema op de achterzijde geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 3 weken (21 dagen). Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloeuitslagen en uw algemene toestand dit toelaten. Voorafgaand aan een chemokuur gebeurt steeds een bloedcontrole om te beoordelen of de bloedwaarden goed zijn voor de volgende therapie. Zoniet wordt de kuur uitgesteld. Na elke toediening krijgt u een afspraak mee voor de volgende cyclus of een tussentijdse CT-scan via de raadpleging.

### AANDACHTSPUNTEN

Antibraakmiddelen kunnen soms langdurige constipatie geven. Daarom wordt één tablet bisocodyl 5 mg (Dulcolax®) meegegeven. Neem deze medicatie op dag 2 's avonds wanneer u nog geen ontlasting heeft gehad sinds de chemotherapie.

Bij constipatie mag u daarenboven Movicol zakjes nemen tot 6 per dag telkens met voldoende water. Uw arts schrijft deze therapie voor zodat u een voorraad van deze medicatie kan afhalen bij de apotheek.

Bij misselijkheid mag u tot 6 tabletten alizapride (Litican®) innemen per dag.

### MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

- Verminderd aantal witte en rode bloedcellen
- Verminderd aantal bloedplaatjes
- Misselijkheid en braken
- Mondslimvliesontsteking
- Smaak- en reukverandering
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op seksualiteit en intimiteit
- Constipatie
- Huidveranderingen
- Ooglast

### NEVENWERKINGEN VOORKOMEN

- Infecties voorkomen
- Wondjes voorkomen
- Voldoende drinken
- Mondhygiëne en mondspoeling
- Rust en beweging
- Huidverzorging
- Voorgeschreven medicatie innemen

## WAT DOEN ALS ER NEVENWERKINGEN ZIJN?

Zie brochure **nevenwerkingen bij chemotherapie** voor de eerste hulp. Bij volgende nevenwerkingen adviseren we dat u contact neemt met uw huisarts of met de verpleegkundig consultant:

- Na inname van 1 Paracetamol van 1g **blijvend koorts** (vanaf 38°C) en/of rillingen
- Langer dan 2 dagen diarree, ondanks de inname van Imodium
- Diarree, maar ook moet braken
- Duizeligheid, kortademigheid of pijn op de borst of moe bij de minste inspanning
- Spontaan blauwe plekken, regelmatig een bloedneus of verlengde menstruatie. Bloed braken of bloed in de urine
- Veranderingen in het mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes in uw mond
- Niet meer voldoende eten en drinken
- Ernstige vermagering
- Uitgesproken moe en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunnen uitvoeren

**Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen als u vermoedt dat u een infectie hebt. Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige.**

## CONTACTGEGEVENS

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig consultants, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste en de psycholoog werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met: de verpleegkundig consultants **089/80 63 71** of de raadpleging oncologie **089/80 83 30** of dagzaal oncologie **089/80 83 40**.

Bij problemen buiten de werkuren kunt u bellen naar de telefooncentrale van ZOL **089/80 80 80** of de spoeddienst.

## SUCCES MET DE BEHANDELING!

Productnaam	Therapie om de drie weken			Duur
	Dag 1 = dagklieniek	Dag 2 = thuis	3-21 = thuis	
Akynzeo (tegen misselijkheid)	1 capsule			
Cortisone (lage dosis)	1 ampul intraveneus			
Spoeling (NaCl)	1 infuus			
Carboplatine	<b>1 infuus</b>			30 tot 60 min
Bisacodyl 5mg = Dulcolax		's avonds 1 tablet indien nog geen stoelgang sinds de chemotherapie		