

Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om chemotherapie te starten Paclitaxel (Taxol) voor de behandeling van borstkanker.

PACLITAXEL BIJ BORSTKANKER

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De toediening wordt georganiseerd op de dagzaal oncologie en gebeurt via een infuus. Het schema op de achterzijde geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 3 weken (21 dagen) en omvat 3 dagopnames voor chemotherapie: dag 1, dag 8 en dag 15. Het aantal cycli wordt u meegedeeld door de arts. U komt dus wekelijks op de dagzaal. Voorafgaand aan een chemokuur gebeurt steeds een bloedcontrole om te kunnen beoordelen of de bloedwaarden goed zijn voor de volgende therapie. Zoniet wordt u gecontacteerd om de kuur uit te stellen. Na elke toediening krijgt u een afspraak mee voor de volgende cyclus.

AANDACHTSPUNTEN

Het toedienen van corticosteroïden kan bijwerkingen veroorzaken zoals maaglast, slaapmoeilijkheden, stemmingswisselingen, verhoogde eetlust. De medicatie is echter belangrijk voor uw behandeling, het zorgt voor een vermindering van de bijwerkingen en allergische reacties. Bespreek deze klachten met uw zorgverleners.

Afkoelende pantoffels en wanten zullen u aangeraden worden om zenuwschade (neuropathie) aan de vingers en de tenen te voorkomen. Door de koude vernauwen de bloedvaten in handen en voeten. Zo kan de chemotherapie niet tot in uw vingertoppen of tenen komen en er geen schade veroorzaken.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

- Verminderd aantal witte -en rode bloedcellen
- Verminderd aantal bloedplaatjes
- Nagelverandering (speciale nagellak wordt aangeraden)
- Misselijkheid en braken
- Mondslimvliesontsteking
- Smaak- en reukverandering kan
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op seksualiteit en intimiteit
- Diarree
- Haarverlies (ijskap kan besproken worden)
- Huidveranderingen
- Ooglast
- Griepig gevoel
- Spierpijnen
- Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen (ijswanten en -pantoffels ter preventie)

NEVENWERKINGEN VOORKOMEN

- Infecties voorkomen
- Wondjes voorkomen
- Mondhygiëne en mondspoeling
- Rust en beweging
- Huidverzorging
- Voorgeschreven medicatie nemen

WAT DOEN ALS ER NEVENWERKINGEN ZIJN?

Zie brochure nevenwerkingen bij chemotherapie voor de eerste hulp. Bij volgende nevenwerkingen adviseren we dat u contact neemt met uw huisarts of met de verpleegkundig consulent:

- Aanhoudend krampende pijn of druk in uw borstkas
- Na inname van 1 Paracetamol van 1g **blijvend koorts** (vanaf 38°C) en/of rillingen
- Langer dan 2 dagen diarree, ondanks de inname van Imodium
- Diarree, maar ook braken
- Duizeligheid en kortademigheid of pijn op de borst of moe bij de minste inspanning
- Spontaan blauwe plekken, regelmatig een bloedneus of verlengde menstruatie. Bloed braken of bloed in de urine

- Veranderingen in het mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes in uw mond
- Niet meer voldoende kunnen eten en drinken
- Ernstige vermagering
- Uitgesproken moe en dagdagelijkse activiteiten niet meer kunnen uitvoeren

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen als u vermoedt dat u een infectie hebt. Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige.

CONTACTGEGEVENS

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, de verpleegkundig consulent, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste, de psycholoog werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met de verpleegkundig consulenten 089 80 63 70, dagziekenhuis oncologie 089 80 83 40 of de raadpleging oncologie 089 80 83 30.

Bij problemen buiten de werkuren kunt u bellen naar de telefooncentrale van het ZOL 089 80 80 80 of de dienst Spoedgevallen.

SUCCES MET DE BEHANDELING

Productnaam	Therapie wekelijks			Duur
	Dag 1 = dagklieniek	Dag 8 = dagklieniek	Dag 15 = dagklieniek	
Paclitaxel	1 infuus	1 infuus	1 infuus	60 min
Solu-Medrol 40 mg (cortisone)	1 ampul intraveneus (bij opstart van de chemotherapie)			
Spoeling (NaCl)	1 infuus	1 infuus	1 infuus	