

Beste patiënt,

Via deze fiche willen we u informeren over het gebruik van enhertu bij borstkanker. Mocht u tijdens de behandeling nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons deze te stellen.

TRASTUZUMAB DERUXTECAN (ENHERTU®)

WAT IS ENHERTU EN HOE WERKT HET?

Enhertu is een doelgerichte kankertherapie die zich richt op HER2-positieve kankercellen, waar het chemotherapie rechtstreeks in de kankercel aflevert en deze vernietigt. Het is een koppeling van 2 geneesmiddelen: één doelgerichte therapie (trastuzumab) en één chemotherapie (deruxtecan).

Enhertu wordt gegeven voor de behandeling van gemetastaseerde Her2-positieve of Her2 low borstkanker of borstkanker die niet kan verwijderd worden door chirurgie.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De toediening wordt georganiseerd op de dagzaal oncologie (GDK1).

Enhertu wordt via een infuus toegediend:

- **Elke 3 weken** (1 keer om de 21 dagen) als de bloedsuitslagen en je algemene toestand het toelaten
- De 1ste toediening duurt 90 minuten, vanaf de tweede toediening 30 minuten indien goed verdragen

Het schema op de achterzijde geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

Niet iedereen ervaart bijwerkingen, maar mogelijke klachten zijn :

- Misselijkheid of braken
- Vermoeidheid
- Verminderde eetlust
- Constipatie
- Stomatitis (ontsteking van het mondslimvlies)
- Spier en botpijn
- Haaruitval, geheel (10%) of gedeeltelijk (30%)
- Verstoring van de bloedwaarden (lage witte bloedcellen, rode bloedcellen, bloedplaatjes)
- Longproblemen (interstitiële longziekte of pneumonitis (ontsteking van de longblaasjes)
- Allergische reactie of infuusreactie (tijdens of kort na infusie)

AANDACHTSPUNTEN BIJ DE BEHANDELING

- Enhertu kan een ontsteking van de longblaasjes veroorzaken. Deze bijwerking is zeldzaam maar kan ernstig zijn. Symptomen hiervan kunnen zijn: hoest, kortademigheid, koorts, andere nieuwe of verergerende ademhalingsproblemen. Als deze symptomen optreden neem je direct contact op met je behandelende arts.
- Enhertu kan ook een invloed hebben op je hartfunctie. Hiervoor zal je op regelmatige tijdstippen een hartfunctieonderzoek krijgen. Meld aan je arts als je last krijgt van kortademigheid, pijn op de borstkas of opgezwollen voeten.
- Gebruik betrouwbare anticonceptie tijdens en tot 7 maanden na de behandeling.
- Meld een eventuele infuusreactie of allergische reactie tijdens de toediening aan de verpleegkundige: huidsuitslag, benauwd voelen, lage bloeddruk, rillingen, koorts, misselijk, transpireren.

WAT DOEN ALS ER NEVENWERKINGEN ZIJN?

Zie brochure nevenwerkingen bij chemotherapie voor de eerste hulp. Bij volgende nevenwerkingen adviseren we dat u contact neemt met uw huisarts of met de verpleegkundig consulent of dat u zich begeeft naar de spoeddienst.

- De symptomen beschreven bij aandachtspunten (hogerop)
- Na inname van 1 paracetamol van 1gr blijvende koorts (vanaf 38°C) en /of rillingen
- Langer dan 2 dagen diarree, ondanks de inname van Immodium
- Diarree maar ook braken
- Duizeligheid, kortademigheid of pijn op de borst of moe bij de minste inspanning
- Spontaan blauwe plekken, regelmatig een bloedneus of verlengde menstruatie. Bloed braken of bloed in de urine.

- Veranderingen in het mondslijmvlies, blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes in uw mond.
- Niet meer voldoende kunnen eten en drinken
- Ernstige vermagering
- Uitgesproken moe en dagdagelijkse activiteiten niet meer kunnen uitvoeren.

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen als u vermoedt dat u een infectie hebt. Neem onmiddellijk contact op met uw huisarts.

CONTACTGEGEVENS

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig consulent, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste, de psycholoog werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking. Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met de verpleegkundig consulenten borst 089/80 63 70, dagziekenhuis oncologie 089/ 80 83 40 of de raadpleging oncologie 089 80 83 30.



SUCCES MET DE BEHANDELING

Productnaam	Dag1 =dagklieniek	Dag 2= thuis	Dag 3-21	info
Glucose (waakinfuus)	1 infuus			
Dexamethason 10mg	2 ampullen 5 mg intraveneus			
Palonosetron	0.25 mg intraveneus			
Enhertu®	1 infuus			1ste toediening over 90 minuten . Vanaf de tweede toediening over 30 minuten zo de eerste maal goed verdragen werd.
Litican 50mg		1 tablet zo nodig tot max 6/d	1 tablet zo nodig tot max 6/d	bij misselijkheid
Dexamethasone 10mg		1 capsule		