

Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om te starten met sacituzumab govitecan (Trodelvy®) voor de behandeling van borstkanker.

SACITUZUMAB GOVITECAN (TRODELVY®)

WAT IS TRODELVY + WERKING

Sacituzumab Govitecan is een antilichaam-geneesmiddel conjugaat (ADC) : het combineert een antilichaam dat zich bindt aan de kankercellen met chemotherapie (SN-38). Het antilichaam hecht zich aan het eiwit Trop-2, dat in grote hoeveelheid aanwezig is op de kankercellen. Zodra het antilichaam aan Trop-2 bindt, zal het antilichaam met de chemotherapie de cel in worden gehaald. Eénmaal in de cel wordt de verbinding tussen het antilichaam en de chemotherapie verbroken en zo komt de chemotherapie rechtstreeks in de kankercel vrij. Hierdoor sterft de kankercel af. Omdat de chemotherapie direct in de kankercel wordt afgeleverd, is er in vergelijking met traditionele chemotherapie minder schade aan gezond weefsel.

INDICATIE

- Niet opereerbare of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker (mTNBC) die reeds twee of meer eerdere systemische therapieën hebben gekregen, waaronder ten minste één voor gevorderde ziekte.
- Gemetastaseerde hormoon-receptor positieve, her2-negatieve borstkanker na eerdere therapieën.

VERLOOP VAN DE BEHANDELING

- De toediening wordt georganiseerd op de dagzaal oncologie en wordt toegediend via een infuus.
- Twee keer per cyclus van 21 dagen (Dag 1 en dag 8 van elke cyclus) als de bloedsuitslagen en je algemene toestand het toelaten. De derde week van elke cyclus is een rust-week waarin er geen chemotherapie toegediend wordt.
- Elke cyclus wordt om de 3 weken herhaald zolang de behandeling werkt en de nevenwerkingen aanvaardbaar zijn.
- De eerste toediening duurt 3 uur; vanaf de tweede toediening wordt het toegediend over 90 minuten, indien het eerder goed verdragen werd.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

Niet iedereen krijgt dezelfde bijwerkingen, maar veelvoorkomende klachten zijn:

- Diarree of constipatie
- Misselijkheid en/of braken
- Vermoeidheid
- Haaruitval
- Huidrash
- Verminderde eetlust
- Neutropenie (tekort aan witte bloedcellen, verhoogd infectierisico)
- Lage rode bloedcellen
- Lage bloedplaatjes
- Koorts of griepachtig gevoel na toediening

AANDACHTSPUNTEN

- Meld een eventuele infuusreactie/ allergische reactie tijdens de toediening aan de verpleegkundige : huiduitslag, benauwd voelen, lage bloeddruk, rillingen, koorts, misselijk, transpireren
- Drink voldoende bij diarree en neem eventueel medicatie zoals voorgeschreven.
- Neem contact op bij ernstige diarree en/of koorts
- Bloedcontroles zijn nodig vóór elke toediening
- Gebruik betrouwbare anticonceptie tijdens en tot 6 maanden na de behandeling.

CONTACTGEGEVENS

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, de verpleegkundig consulent, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste en de psycholoog werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kan u steeds contact opnemen met de verpleegkundig consulenten borst op 089/80 63 70, dagzaal oncologie 089/80 83 40 of de raadpleging oncologie 089/80 83 30.

Bij problemen buiten de werkuren kunt u bellen naar de telefooncentrale van het ZOL 089/80 80 80 of de dienst Spoedgevallen.

SUCCES MET DE BEHANDELING.

Productnaam	dag 1= dagkliniek	dag 8= dagkliniek	dag 9-21= thuis	duur
NaCl (spoeling)	1 infuus	1 infuus		
cetirizine 10mg	1 tablet	1 tablet		
paracetamol 1000mg	1 tablet	1 tablet		
dexamethasone 10mg	2 ampullen 5mg	2 ampullen 5mg		
palonosetron 0.25mg	1 ampul intraveneus	1 ampul intraveneus		
sacituzumab - govetican	1 infuus	1 infuus		1ste maal 3u, nadien 90 minuten
lilician bij misselijkheid max 6x/d				