

Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om doelgerichte immuuntherapie te starten (Tarlatab) voor de behandeling van een kleincellige longkanker (SCLC).

TARLATAMAB

HOE WERKT TARLATAMAB?

Tarlatab is een doelgerichte immuuntherapie die wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met de diagnose van kleincellige longkanker (SCLC).

Tarlatab brengt afweercellen (T-cellen) rechtstreeks in contact met kankercellen. Hierdoor kunnen de T-cellen de kankercellen beter aanvallen. Het geneesmiddel helpt dus het eigen afweersysteem om kankercellen te herkennen en aan te vallen.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De eerste cyclus Tarlatab wordt gesplitst in 3 toedieningen (dag 1-8-15), omdat de dosis dient opgebouwd te worden. De eerste toediening (dag 1) wordt georganiseerd op de verblijfsafdeling. U zal hiervoor één nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven. Dag 8, 15 en de volgende kuren (1x/2 weken) zullen plaatsvinden op dagzaal oncologie.

Het schema op de achterzijde geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Een cyclus duurt

4 weken (28 dagen) en omvat het 2 toedieningen via de dagzaal. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 4 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en uw algemene toestand dit toelaten.

Indien uw bloedresultaten afwijkend zijn en hierdoor de toediening moet worden uitgesteld, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld. Na elke toediening krijgt u een afspraak mee voor de volgende cyclus of een tussentijdse CT-scan via de raadpleging.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

- Verminderd aantal witte -en rode bloedcellen
- Verminderd aantal bloedplaatjes
- Misselijkheid en braken
- Mondslimvliesontsteking
- Smaak -en reukverandering
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op seksualiteit en intimiteit
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Buikloop (diarree)
- Verstopping (constipatie)
- Vermoeidheid
- Huidverandering en jeuk
- Grieperig gevoel
- Verminderde eetlust

CRS EN ICANS

Uw parameters (temperatuur, bloeddruk, saturatie) worden tijdens en na de toediening opgevolgd. Vooral bij de eerste toediening is dit belangrijk.

Er is een kans op het cytokine-release syndroom (**CRS**). Meestal bij cyclus 1, het lijkt op griep maar het kan een ernstig verloop hebben. Dit syndroom treedt op wanneer uw lichaam stoffen, cytokinen genoemd, in het bloed afgeeft.

Neem onmiddellijk contact met uw arts/zorgverlener als u tekenen of symptomen van CRS ervaart, waaronder:

- koorts en rillingen
- kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden
- snelle of onregelmatige hartslag
- duizeligheid
- misselijkheid en braken

Ook worden er enkele vragen gesteld om te bepalen of u nog voldoende in tijd en ruimte georiënteerd bent. Dit heeft te maken met de mogelijkheid op neurologische bijwerkingen, namelijk het immuunefectorcel-geassocieerd neurotoxiciteitssyndroom (**ICANS**). Dit is een syndroom dat tijdelijk de herse-

nen en het zenuwstelsel kan aantasten. Deze klachten ontstaan meestal vanaf cyclus 2.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts/zorgverlener als u tekenen of symptomen van **ICANS ervaart**, waaronder:

- moeite met spreken
- geheugenverlies
- hoofdpijn
- veranderde of verminderde bewustzijnstoestand
- verwardheid
- desoriëntatie of onvermogen om helder te denken
- toevallen (insulten)
- verlies van evenwicht of coördinatie
- zwakte of gevoelloosheid van armen en benen
- beven van handen of ledematen

WAT DOEN ALS ER NEVENWERKINGEN ZIJN?

Bij volgende symptomen adviseren we dat u contact neemt met uw (huis)arts of met de verpleegkundig consulent.

- Aanhoudend krampende pijn of druk in uw borstkas
- Langer dan 2 dagen diarree hebt

- U zich duizelig voelt, kortademig bent of pijn op de borst ervaart
- Niet meer voldoende kunt eten en drinken
- U ernstig vermagert
- Bij uitgesproken vermoeidheid waardoor dagdagelijkse activiteiten niet meer lukken

Bij enkel koorts zonder tekenen van CRS vanaf 38°C mag u onderstaande ondernemen:

- Neem paracetamol 1g om de 6 uur
- Drink voldoende water/sportdrink zoals Aquarius
- Neem voldoende rust

Indien u zich onwel voelt, lage bloeddruk heeft of de koorts langer dan 24 uur aanhoudt dient u contact op te nemen met uw (huis)arts of met de verpleegkundig consulent. In het weekend of 's nachts moet u zich melden op de dienst spoedgevallen.

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen als u vermoedt dat u een infectie hebt. Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige.

CONTACTGEGEVENS

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig consulent, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste, de psycholoog werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met:

- secretariaat pneumologie: 089/80 82 60
- verpleegkundig consulenten pneumologie: 089/80 63 65
- dagzaal oncologie: 089/80 83 40

Bij problemen buiten de werkuren kunt u bellen naar de telefooncentrale van ZOL 089/ 80 80 80 en vragen om doorverbonden te worden met de wachtdienst pneumologie.

SUCCES MET DE BEHANDELING!

Productnaam	Dag				Duur
	1	8	15	16-28	
Tarlatamab - Cyclus 1	1 mg*	10 mg**	10 mg	rust	*24 uur **6uur
Methylprednisolone 40mg	infuus	infuus			

Productnaam	Dag				Duur
	1	8	15	16-28	
Tarlatamab	10 mg	rust	10 mg	rust	1 uur