

Isolatiemaatregelen bij vervoer van patiënten

Document type:	Procedure / PROC	Document subtype:	.
Doelgroep:	Ziekenhuisbreed	Subdoelgroep:	.
Auteur:	Tine Nelis; Lize Ceunen; Liesbeth Wyers	Keurder:	Els Oris
Geldig van:	04/12/2018	Geldig tot:	03/12/2021
Document-nr:	VPPZ-VPROC4-0284	Versie-nr:	3.0
Campus:	Alle		

1. Doelstelling

Indien vervoer van geïsoleerde patiënten noodzakelijk is, wordt onderstaande procedure toegepast.

2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Alle medewerkers van de (onderzoeks-)afdeling, consultatie nemen de voorgeschreven maatregelen in acht en dit om overdracht te voorkomen.

3. Definities/Begripsomschrijvingen

Isolatiemaatregelen: onder isolatiemaatregelen verstaat men preventieve maatregelen die erop gericht zijn besmetting tussen patiënten, personeelsleden en omgeving te voorkomen. Deze maatregelen kennen verschillende gradaties: van zeer eenvoudige richtlijnen tot de meest strenge voorschriften.

4. Inhoud

Het vervoer van patiënten in isolatie verpleegd, wordt beperkt tot het uiterst noodzakelijke.

4.1. Indien mogelijk gaat het consult/onderzoek **op de kamer** door:

- Verwittig de onderzoeksafdeling/arts telefonisch. De isolatie-indicatie is zichtbaar in het EPD.
- Volg de instructies op de isolatiefiche aan de kamerdeur bij het betreden van de kamer.

4.2. Indien een **transfer** naar onderzoeksafdeling/consult **toch noodzakelijk** is:

- Verwittig de onderzoeksafdeling/arts telefonisch. De isolatie-indicatie is zichtbaar in het EPD.
- Maak goede afspraken zodat er geen of slechts korte wachttijd is voor de patiënt.
- Het vervoer van de geïsoleerde patiënten gebeurt door medewerkers van de afdeling. Deze medewerkers moeten zelf geen extra maatregelen nemen maar hebben wel steeds aandacht voor goede handhygiëne zoals voorgeschreven op isolatiefiche ter hoogte van de kamerdeur.
 - Bij het verlaten van de kamer worden bij de patiënt de maatregelen genomen zoals op de isolatiefiche beschreven staan.

- Indien vervoer met bed: wordt voor het vervoer de baar aan het hoofd- en voeteinde ontsmet (Umonium spray of wipes, indien het gaat om Clostridium difficile of norovirus wordt een javeloplossing gebruikt).
 - Indien vervoer met rolstoel: wordt de rolstoel afgedekt met een proper steeklaken. De handgrepen en de contactpunten van de rolstoel worden na gebruik ontsmet (Umonium spray of wipes, indien het gaat om Clostridium difficile of norovirus wordt een javeloplossing gebruikt).
 - Als er zuiver materiaal (vb. dossier, medicatie, monitor, ...) wordt meegenomen tijdens het vervoer, voorziet men het bed van een propere spreij.
- Medewerkers hebben steeds aandacht voor goede handhygiëne.

5. Referenties

1. Vande Putte, M. (2017). Van hygiëne tot infectiepreventie. Acco Leuven.

6. Bijlagen/verwijzingen/synoniemen

7. Revisie overzicht

09-04-2014	Creatie document	T. Nelis
23-02-2017	Aanpassing – vervoer bed, rolstoel, zuiver materiaal	L. Wyers
15-10-2018	Aanpassing – werkwijze EPD	T. Nelis