

Spoedcast - SOAs

Seizoen 3
10-2023

Key points

1. Urethritis

Oorzakelijk: Chlamydia Trachomatis meest frequente oorzaak in westerse landen, Andere oorzaken zijn Neisseria Gonorrhoea, Trichomonas Vaginalis en Mycoplasma Genitalium.

Diagnose: Best urethrale wisser (hoogste sensitiviteit en specificiteit) voor bevestiging oorzakelijke kiem en antibiogram. Vaak niet haalbaar op spoedgevallen, daarom wordt vaak gekozen voor urinesediment onderzoek. Hier liefst een First Void staal, maar ook niet altijd haalbaar op spoedgevallen.

Behandeling: Doxycycline 100mg, 2x/d, samen met 1x Ceftriaxone 1g IM. Doxycycline behandelt de **intracellulaire kiemen (Mycoplasma, Chlamydia)**, Ceftriaxone de eventuele **Neisseria Gonorrhoea**. Bij bevestigde **Mycoplasma** wordt nabehandeld met Azithromycine, 1x1g, gevolgd door 500mg 1x/d gedurende 4dagen. *Bij zwangerschap* wordt het 'oude' regime voorgeschreven: Ceftriaxone 1g IM 1x, Azithromycine 1x1g PO.





Bij **Trichomonas Vaginalis** wordt behandeld met 2x500mg Metronidazole, gedurende 7dagen.

Alle (recente) bedpartners dienen opgespoord en verwittigd te worden om zich te laten testen en/of behandelen.

2. SYFILIS (zie samenvatting op volgende bladzijde)

Just The Facts Diagnosing and Managing Syphilis in the Emergency Department

Weaver VK, Sutherland KA, Koh JJ



Referentias

1. [Just the facts: diagnosing and managing syphilis in the emergency department.](#) CJEM. 2023 Aug 14. doi: 10.1007/s43678-023-00556-5. Epub ahead of print.