



Spoedcast - episode 8

*Seizoen 2
5-8-2022*

Key points

- ◇ Pietermannen steek:
Immersie in heet water (zo heet als patiënt tolereert zonder huidletsel, max 45°C)
Analgesie zo nodig
- ◇ Aanraking met kwallen:
Verschillende soorten bestaan, kwallen kunnen gif afgeven ook nadat ze levenloos aanspoelen. In België zijn de meeste soorten relatief onschadelijk. Nematocysten komen in aanraking met de huid en geven irritatie en inflammatie. Behandeling door spoelen met verwarmd 4-5% azijnzuur (type huishoud azijn). Portugees Oorlogsschip is gevaarlijker en kan systeemtoxiciteit geven
- ◇ Teken: In België geen indicatie voor 1-malige profylaxe bij tekenbeet. Best zo snel mogelijk verwijderen. Behandeling voor Lyme's disease verschilt naargelang het stadium en lokale guidelines. Alle stadia van Lyme's disease moeten antibiotisch behandeld worden.
- ◇ Adders: 10-50% van de beten gebeuren met gifinjectie. Ook een niet-giftige beet kan lokaal infectie geven! Bij beten in een lidmaat: elevatie, immobilisatie en alles wat kan knellen verwijderen. Zwelling kan tot 72u na de beet toenemen. Bij bedreigd lidmaat of systeemtoxiciteit: antigifcentrum contacteren voor toediening antidota. Antidota bevatten antilichamen van paard of schaap en kunnen anafylaxie geven, toediening moet daarom steeds in een gemonitorde setting plaatsvinden.

Referenties

1. Antigifcentrum: www.antigifcentrum.be
2. Tintinalli's Emergency Medicine - 9th edition. McGraw-Hill publishers, NY