

Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om doelgerichte therapie te starten (Alectinib) onder de vorm van tabletten voor de behandeling van een niet-kleincellige longkanker.

LORLATINIB

VOORBEREIDING

Er is geen specifieke voorbereiding nodig.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De behandeling verloopt volledig op ambulante wijze. U komt naar onze raadpleging waar u gezien wordt door een arts voor een bloedname en klinisch onderzoek. Nadien krijgt u een voorraad tabletten mee naar huis meestal voor drie maanden (1 cyclus = 4 weken). Om de drie maanden wordt er een controle CT-scan voorzien om het effect van de therapie te evalueren. De therapie neemt u dagelijks in volgens het schema op de achterzijde.

AANDACHTSPUNTEN

- Neem lorlatinib in samen met de maaltijd telkens 's morgens (1 tablet).
- Lorlatinib kan interageren met andere medicatie, supplementen of voedsel zoals: pompelmoes(sap), granaatappel, sterfruit of preparaten op basis van sint-janskruid. U mag deze producten dus niet combineren. Bij twijfel contacteert u best een arts of onze oncocoach
- Wanneer u voor de eerste keer start met lorlatinib dient er een controle bloedname te gebeuren 14 dagen na de eerste inname bij de huisarts en zal uw longarts u na 4 weken terugzien voor een eerste controle.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

- Verhoogd cholesterol / lipiden
- Trage hartslag
- Smaak- en reukverandering
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op seksualiteit en intimiteit
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Buikloop (diarree) / obstipatie
- Huidveranderingen
- Vochtophoping (oedeem)
- Tintelingen in handen / voeten

NEVENWERKINGEN VOORKOMEN

- Infecties voorkomen
- Wondjes voorkomen
- Voldoende drinken
- Mondhygiëne en mondspoeling
- Rust en beweging
- Huidverzorging
- Voorgeschreven medicatie innemen