

Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om doelgerichte therapie te starten (Osimertinib) onder de vorm van tabletten voor de behandeling van een niet-kleincellige longkanker.

# OSIMERTINIB

## VOORBEREIDING

Er is geen specifieke voorbereiding nodig.

## HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De behandeling verloopt volledig op ambulante wijze. U komt naar onze raadpleging waar u gezien wordt door een arts voor een bloedname en klinisch onderzoek. Nadien krijgt u een voorraad tabletten mee naar huis meestal voor drie maanden (1 cyclus = 4 weken). Om de drie maanden wordt er een controle CT-scan voorzien om het effect van de therapie te evalueren. De therapie neemt u dagelijks in volgens het schema op de achterzijde.

## AANDACHTSPUNTEN

- Neem osimertinib liefst elke ochtend in op hetzelfde tijdstip, dit mag bij het ontbijt of nuchter.
- Osimertinib kan interageren met andere medicatie, supplementen of voedsel zoals: pompelmoes(sap), granaatappel, sterfruit of preparaten op basis van sint-janskruid. U mag deze producten dus niet combineren. Bij twijfel contacteert u best een arts of onze oncocoach.
- Wanneer u voor de eerste keer start met osimertinib dient er een controle bloedname te gebeuren 14 dagen na de eerste inname bij de huisarts en zal uw longarts u na 4 weken terugzien voor een eerste controle.

## MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

- Misselijkheid en braken
- Mondslimvliesontsteking
- Smaak- en reukverandering
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op seksualiteit en intimiteit
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Buikloop (diarree)

## NEVENWERKINGEN VOORKOMEN

- Infecties voorkomen
- Wondjes voorkomen
- Voldoende drinken
- Mondhygiëne en mondspoeling
- Rust en beweging
- Huidverzorging
- Voorgeschreven medicatie innemen