

Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om chemotherapie te starten (Topotecan) voor de behandeling van een kleincellige longkanker.

TOPOTECAN

VOORBEREIDING

Er is geen specifieke voorbereiding nodig.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De toediening wordt georganiseerd op de dagzaal oncologie en gebeurt via tabletten die u meekrijgt naar huis. Het schema op de achterzijde geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 3 weken (21 dagen) en omvat 1 contact op de dagzaal voor afhalen van de tabletten die u gedurende 5 opeenvolgende dagen moet innemen. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloeduitslagen en je algemene toestand dit toelaten. De oncocoach zal u voor de opname thuis contacteren om de uitslag van de bloedafname mee te delen. Na elke toediening krijgt u een afspraak mee voor de volgende cyclus of een tussentijdse CT-scan via de raadpleging.

AANDACHTSPUNTEN

- Topotecan wordt één keer per dag ingenomen van dag 1 tot en met dag 5 van de cyclus.
- Topotecan wordt systematisch op een lege maag of bij de maaltijd ingenomen.
- Interactie met voeding: vermijd tijdens de inname van topotecan het eten of drinken van pompelmoes(sap), granaatappel, sterfruit of preparaten op basis van sint-janskruid.
- Topotecan moet bewaard worden in de koelkast.
- Topotecan is fototoxisch en kan dus huidverbranding/uitslag geven indien u onbeschermd in de zon komt. Smeer u dus goed en regelmatig in met zonnecrème factor 50 indien u toch in zon komt.

Bij misselijkheid mag u tot 6 tabletten Litcan innemen per dag. Bij constipatie mag u Movicol zakjes nemen tot 4 per dag telkens met voldoende water. Uw arts schrijft deze therapie voor zodat u een voorraad van deze medicatie kan afhalen bij de apotheek.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

- Verminderd aantal witte -en rode bloedcellen
- Verminderd aantal bloedplaatjes
- Misselijkheid en braken
- Mondslimvliesontsteking
- Smaak- en reukverandering
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op seksualiteit en intimiteit
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Buikloop (diarree)
- Huidveranderingen
- Haarverdunning, zelden haarverlies
- Ooglast
- Oorsuizingen en verminderd gehoor
- Grieperig gevoel
- Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen

NEVENWERKINGEN VOORKOMEN

- Infecties voorkomen
- Wondjes voorkomen
- Voldoende drinken
- Mondhygiëne en mondspoeling
- Rust en beweging
- Huidverzorging
- Voorgescreven medicatie innemen