

## Occult primary

### 1. Inleiding

Definitie: metastatische tumor in een halsklier en geen primaire tumor gevonden na volledige investigatie.

### 2. Diagnose en Work-up

- Anamnese en algemeen klinisch onderzoek en neus keel oor- onderzoek, met panendoscopie
- CT Hals en NMR suprahyoïdaal
- FNAC halsklier, eerder dan open biopsie
- PET/CT scan
- Panendoscopie onder narcose met eventueel blinde biopsiename en zo mogelijk (bilaterale) tonsillectomie
- Zo klier level IV, laag level V: bronchoscopie/gastro-oesophagoscopie
- p16 kleuring, Ebertesting indien SCC of ongedifferentieerd

### 3. TNM Classificatie

8<sup>ste</sup> editie

### 4. Behandeling

- Bij voorkeur eerst halsklierdissectie I-V + eventueel tonsillectomie (enkel bij SCC) gevolgd door radio(chemo)therapie (concomitant chemotherapie indien kapseldoorbraak en/of positief SV)
- Inoperabel: Radio(chemo)therapie  
Bij niet-complete respons nekdissectie na 2-3 maand indien mogelijk

**Opm APO: melanoma/lymphoma/schildklier carcinoma** (zie respectievelijke hoofdstukken)

### 5. Follow-up

zie standaardschema

PET/CT na 12 weken in geval van radiochemotherapie zonder nekdissectie